



**Kompleksowy
program higieny**

Bezpieczny gabinet beauty

Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.



medilab.pl

1 Sterisol Ąkta Liquid Soap
Sterisol AHD 1000
Sterisol Phago'Gel
MediSoap Neutral
Phago'Gel
Mediwax

2 Enzymex L9

3 TASKI Sprint Degerm

4 Oxivir Plus Spray
Lysoformin Plus-Schaum
Mediwipes DM Premium

5 MediQuick
Aerodesin 2000
Oxivir Plus Spray
Mediwipes Plus

6 Mediroll
Medibag
Testy do kontroli sterylizacji



- 

STERISOL ÄKTA LIQUID SOAP

Mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Przebadane dermatologicznie oraz zgodnie z normą EN 1499. Dedykowane do dozownika Sterisol.
- 

STERISOL AHD 1000

Płyn na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Dedykowany do dozownika Sterisol.
- 

STERISOL PHAGO'GEL

Żel na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Dedykowany do dozownika Sterisol.
- 

MEDISOAP NEUTRAL

Mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Zawiera substancje pielęgnujące naturalną warstwę skóry.
- 

PHAGO'GEL

Żel na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro).
- 

MEDIWAX

Wysokiej jakości krem do pielęgnacji skóry rąk. Zawiera kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i witaminy.
- 

ENZYMEX L9

Trójenzymatyczny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc (M. terrae), Y (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes). Stężenie: min. 0,5%. Czas działania: 10 min.
- 

TASKI SPRINT DEGERM

Koncentrat do dezynfekcji i mycia podłóg oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Noro, Rota). Stężenie: min. 0,5%. Czas działania: min. 5 min.
- 

OXIVIR PLUS SPRAY

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V. Czas działania: min. 5 min. Produkt do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych (krew, wydzieliny, wydaliny, w tym płyny moczowe). Posiada certyfikat WoolSafe.
- 

LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM

Gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa - SV 40). Czas działania: min. 5 min. Nieograniczona kompatybilność materiałowa.
- 

MEDIWIPES DM PREMIUM

Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni. Spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżakobójcze oraz aktywność wobec wirusów: Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Herpes, Corona, Rota, Adeno, Noro. Czas działania: min. 5 min.
- 

MEDIQUICK

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro). Czas działania: min. 30 s.
- 

AERODESIN 2000

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, Y, V (Polio, Adeno, Noro). Czas działania: min. 1 min.
- 

MEDIWIPES PLUS

Chusteczki nasączone alkoholem do dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V. Czas działania: min. 1 min.
- 

MEDIROLL I MEDIBAG

Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.
- 

TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI

Test kontroli skuteczności procesu sterylizacji gorącą parą wodną, tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem w autoklawach.

Bezpieczny gabinet beauty



Procedury higieniczne.

Przed każdym klientem

- Należy zdezynfekować ręce.
- Należy założyć czysty fartuch i rękawiczki.
- Należy przygotować sterylne narzędzia.

Po każdym kliencie

- Należy zdezynfekować ręce.
- Należy używane narzędzia umieścić w wannie dezynfekcyjnej z roztworem środka dezynfekcyjnego.
- Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe łóżka zabiegowego, lampę, klamki, uchwyty, blaty mebli.

Po każdym dniu roboczym i zawsze w razie potrzeby

- Należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe tj. blaty, stoliki, miejsca siedzące.
- Należy zdezynfekować klamki, włączniki światła itp.
- Należy umyć i/lub zdezynfekować podłogę.

Okresowo i zawsze w razie potrzeby

- Należy przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń gabinetu używając urządzeń do dezynfekcji drogą powietrzną.

Procedury dezynfekcji przedmiotów i/lub powierzchni dotykowych należy prowadzić poprzez przecieranie: jednorazowymi gotowymi chusteczkami dezynfekującymi, pianką lub jednorazowym czyściwem nasączonym preparatem dezynfekującym i/lub myjąco-dezynfekującym.

Zaleca się wybór środków dezynfekcyjnych o skuteczności bójczej udokumentowanej badaniami normatywnymi dla obszaru medycznego.

MEDILAB Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska

T: 085 747 93 53

handlowy@medilab.pl



medilab.pl