

MediNews

informator
profesjonalistów
epidemiologii



Wydanie specjalne (1/2021)

**INSTRUKCJA STOSOWANIA
PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI
W CELU REDUKCJI ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO COVID-19**





INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCYJ W CELU REDUKCJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

OPRACOWANIE

dr n. med. Justyna Piwowarczyk

dr Roman Wróbel

mgr Krzysztof Parobczy

mgr Karol Jasik

WYDAWCA



Medilab Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok

medilab.pl

Spis treści

1.	ZASADY OGÓLNE	5
1.1	Ochrona osobista personelu sprząającego.....	5
1.2	Przygotowanie do procedur mycia i/lub dezynfekcji.....	6
1.3	Kolejność czynności.....	6
1.4	Metody wykonywania mycia i/lub dezynfekcji.....	6
1.5	Sposób przygotowania środków do dezynfekcji	6
1.6	Sposób zabezpieczenia personelu	6
2.	PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ	7
2.1	Postępowanie z odpadami.....	7
2.2	Postępowanie z bielizną	8
2.3	Czas rozpoczęcia procedury mycia i dezynfekcji	11
2.4	Dezynfekcja manualna	12
2.5	Dezynfekcja drogą powietrzną	13
3.	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	15
3.1	Dezynfekcja drobnego sprzętu elektronicznego.....	15
3.2	Dezynfekcja materaców	17
3.3	Dezynfekcja ram łóżek.....	19
3.4	Dezynfekcja mebli wypoczynkowych, foteli i krzeseł.....	20
3.5	Dezynfekcja podłóg	22
3.6	Dezynfekcja ścian	24
3.7	Dezynfekcja ciągów komunikacyjnych.....	27
3.8	Dezynfekcja drobnego wyposażenia medycznego	30
3.9	Dezynfekcja zabawek.....	34
3.10	Dezynfekcja mebli	36
3.11	Dezynfekcja toalet.....	38
3.12	Dezynfekcja wyposażenia łazienki.....	40
3.13	Dezynfekcja przedmiotów służących do transportu pacjenta.....	43
3.14	Dezynfekcja przedmiotów mających kontakt z żywnością.....	45
3.15	Postępowanie z dokumentami	50
3.16	Postępowanie z butami.....	51
3.17	Postępowanie z przedmiotami osobistymi pacjenta.....	52
3.18	Postępowanie z przedmiotami pacjenta niemożliwymi do dezynfekcji.....	53
4.	POZOSTAŁE INSTRUKCJE	54
4.1	Postępowanie z plamą materiału biologicznego.....	54
4.2	Postępowanie ze zwłokami.....	56
5.	LITERATURA.....	58

WSTĘP

Pandemia COVID-19 wciąż trwa. Rośnie liczba osób zaszczepionych, ale liczba zakażeń w Polsce jeszcze znamienne nie spadła. Mimo to nastawienie na walkę z epidemią musi zostać zweryfikowane w związku z ogromnymi potrzebami pacjentów z innymi schorzeniami, którzy w ostatnim roku zostali pozbawieni dostępu do świadczeń zdrowotnych. Główną przyczyną było przekształcenie wielu szpitali w specjalistyczne ośrodki dedykowane do zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Organizacja szpitali tymczasowych pozwoliła władzom poszczególnych regionów na przywrócenie niektórych szpitali do standardowego funkcjonowania. Niektóre już powróciły do przyjmowania pacjentów na swoje oddziały, a inne będą robiły to w najbliższej przyszłości. W poszczególnych regionach kraju obowiązują ściśle określone strategie postępowania przeciwepidemicznego, które zawierają między innymi informacje o procedurze powrotu placówek opieki zdrowotnej do swoich dawnych funkcji.

W związku z wieloma pytaniami naszych Klientów o dobór produktów dezynfekcyjnych, adekwatnych w przypadku gruntownej dekontaminacji oddziałów, zdecydowaliśmy się przygotować instrukcje opisujące najważniejsze elementy przygotowania oddziałów, dotychczas będących strefą „skażoną”.

Na podstawie najczęściej zadawanych przez naszych klientów pytań, a także na podstawie literatury, wytycznych producentów środków dezynfekcyjnych oraz własnych doświadczeń powstały niniejsze instrukcje. Zawierają one nasze rekomendacje i odpowiedzi w zakresie zastosowania poszczególnych rozwiązań i preparatów, tak aby dekontaminowane strefy doprowadzić do poziomu bezpiecznego dla pacjentów, także tych z obniżoną odpornością.

Naszym zamiarem było wskazanie najodpowiedniejszej i najbardziej skutecznej formy dekontaminacji środowiska i sprzętu medycznego, gwarantującej skuteczność mikrobiologiczną i uwzględniającej bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

1. ZASADY OGÓLNE

Personel medyczny, pracujący w strefie skażonej COVID-19, musi być zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej na czas przeprowadzania procedur dekontaminacji powierzchni, sprzętu i pomieszczeń.

Prawidłowe zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej ma kluczowe znaczenie dla zachowania ich właściwości ochronnych.

1.1 Ochrona osobista personelu sprząającego

• Środki ochrony indywidualnej

- 1) Personel sprząający powinien stosować środki ochrony indywidualnej:
 - jednorazowa maska na twarz (zakrywająca nos i usta),
 - rękawiczki jednorazowego użytku (podwójne),
 - ochrona oczu (okulary lub przyłbica na twarzy).
- 2) Środków ochrony indywidualnej należy używać, aby zminimalizować bezpośredni kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami.
- 3) Maskę, gogle/przyłbicę służyć ochronie oczu, nosa i ust przed rozpryskami i kurzem powstającym podczas sprząania, a także chronią przed chemikaliami i drobnoustrojami zawieszonymi w powietrzu.
- 4) Jednorazowy podfoliowany fartuch lub kombinezon pozwala uniknąć zanieczyszczenia odzieży personelu.
- 5) Po wejściu do sprząanych pomieszczeń należy unikać dotykania twarzy – pomocne w tym przypadku może być założenie przyłbicy.

• Należy zachować ostrożność podczas zdejmowania środków ochrony indywidualnej, ponieważ z zewnątrz mogą być one zanieczyszczone. Czynności te wykonujemy w sześciu krokach:

- 1) Zdjąć rękawice zewnętrzne, upewniając się, że ich zewnętrzna strona niczego nie dotyka.
- 2) Zdjąć fartuch (nie należy dotykać jego przedniej części).
- 3) Zdezynfekować rękawiczki wewnętrzne.
- 4) Zdjąć maskę (nie należy dotykać zewnętrznej części maski) oraz gogle/okulary/przyłbicę.
- 5) Zdjąć rękawiczki wewnętrzne.
- 6) Umyć i/lub zdezynfekować ręce natychmiast po zdjęciu rękawiczek wewnętrznych.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA RĄK	AHD 1000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ W DŁONIE ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
	PHAGO'GEL	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ W DŁONIE ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
DEZYNFEKCJA GOGLI I PRZYŁBIC	ENZYMEX L9	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 10 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
	DDN 9	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 15 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
	NEODISHER SEPTO ACTIVE	POSTAĆ: GRANULAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 15 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
AKCESORIA	WANNA DEZYNFEKCYJNA	POJEMNOŚĆ: MINIMUM 10 l	PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM OZNAKOWANIU WANNY

UWAGA!

Po zakończeniu czynności należy zdjąć środki ochrony indywidualnej w wyznaczonym miejscu i oddać do utylizacji, umieszczając je w odpowiednich pojemnikach na odpady.

Po zdjęciu odzieży ochronnej należy zdezynfekować ręce wirusobójczym alkoholowym płynem lub żelem. Następnie należy zdezynfekować gogle/przyłbicę metodą przecierania lub zanurzania.

1.2 Przygotowanie do procedur mycia i/lub dezynfekcji

- Przed rozpoczęciem procedury mycia i/lub dezynfekcji należy usunąć odpady ze wszystkich pomieszczeń zgodnie z obowiązującą procedurą.
- Należy zutylizować wszystkie przedmioty nie nadające się do dezynfekcji, w tym broszury i czasopisma, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne.
- Należy przygotować do prania bieliznę pościelową, zasłony, koce i ręczniki wielorazowe.
- Odzież pacjenta należy spakować, oznakować i przekazać do magazynu zgodnie z instrukcją opisaną niżej (patrz: Postępowanie z bielizną prywatną pacjenta).

1.3 Kolejność czynności

- Czynności związane z myciem i/lub dezynfekcją należy prowadzić, rozpoczynając od powierzchni czystych do brudnych.
- Czynności związane z myciem i/lub dezynfekcją należy prowadzić, rozpoczynając od powierzchni pionowych do poziomych.

1.4 Metody wykonywania mycia i/lub dezynfekcji

- Procedury mycia i/lub dezynfekcji należy prowadzić za pomocą ściereczek jednorazowych lub gotowych chusteczek do dezynfekcji.
- Ściereczki do czyszczenia lub gotowe do użycia chusteczki należy wyrzucić do pojemnika na odpady skażone, gdy są w widoczny sposób zabrudzone lub nie są już wystarczająco wilgotne.
- Ściereczki jednorazowe nie mogą być ponownie zanurzane w roztworze myjącym i/lub dezynfekującym.

1.5 Sposób przygotowania środków do dezynfekcji

- Gotowych do użycia środków myjących i/lub dezynfekujących nie należy rozcieńczać.
- Produktów myjących i/lub dezynfekujących nie należy mieszać z innymi środkami chemicznymi.
- Roztwory robocze środków myjących i/lub dezynfekujących należy przygotowywać zgodnie z rekomendacjami producenta.
- W celu osiągnięcia oczekiwanego spektrum działania, należy przestrzegać czasu kontaktu oraz stężenia produktów myjących i/lub dezynfekujących.
- Podczas mycia i/lub dezynfekcji urządzeń elektronicznych należy postępować zgodnie z instrukcją producenta tego sprzętu.

1.6 Sposób zabezpieczenia personelu

- Podczas prowadzenia procedur mycia i/lub dezynfekcji należy stosować się do zaleceń producenta środka dezynfekcyjnego oraz wytycznych dotyczących przebywania w strefie skażonej COVID-19, w zakresie rekomendowanych środków ochrony indywidualnej.

2. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ

Personel medyczny pracujący w strefie skażonej COVID-19 musi być zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej na czas przeprowadzania procedur dekontaminacji powierzchni, sprzętu i pomieszczeń.

Prawidłowe zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej ma kluczowe znaczenie dla zachowania ich właściwości ochronnych.

2.1 Postępowanie z odpadami

- Wszelkie przedmioty nienadające się do mycia, prania i/lub dezynfekcji należy wyrzucić do odpowiednich pojemników/worków na odpady.
- Odpady osobiste pacjenta, tj.: zużyte chusteczki, opakowania, maski i jednorazowe środki higieniczne, papier toaletowy, szczotka do toalety, należy umieścić w workach na odpady skażone.
- Odzież pacjenta należy zewidencjonować i przekazać do magazynu zgodnie z instrukcją opisaną niżej (patrz: Postępowanie z bielizną prywatną pacjenta).
- Podczas pracy z odpadami należy unikać dotykania wnętrza worka/pojemnika na odpady.
- Worek z odpadami należy zapełniać maksymalnie do $\frac{3}{4}$ jego pojemności i nie zgniatać.
- Jeśli zawartość worka na odpady jest mokra, należy użyć dodatkowego worka na wypadek wycieku.
- Po zamknięciu worka z odpadami, należy przetrzeć go jednorazową ściereczką nasączoną preparatem wirusobójczym lub gotową chusteczką dezynfekcyjną.
- Chusteczkę lub ściereczkę po użyciu należy wyrzucić do pojemnika na odpady skażone.
- Wynosząc odpady, należy włożyć worek do drugiego worka, zawiązać/zamknąć go i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem oraz oznakować odpowiednim kodem.
- Pojemnik na odpady po opróżnieniu należy poddać procedurze mycia i dezynfekcji poprzez przetarcie jednorazową ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym o działaniu wirusobójczym lub gotową chusteczką dezynfekcyjną.
- Worek z odpadami należy przewieźć do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEŃ Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ JEDNORAZOWEJ CHUSTECZKI NASĄCZONEJ PREPARATEM
	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ JEDNORAZOWEJ CHUSTECZKI NASĄCZONEJ PREPARATEM
	SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ JEDNORAZOWEJ CHUSTECZKI NASĄCZONEJ PREPARATEM
	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ JEDNORAZOWEJ CHUSTECZKI NASĄCZONEJ PREPARATEM
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ JEDNORAZOWEJ CHUSTECZKI NASĄCZONEJ PREPARATEM
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

2.2 Postępowanie z bielizną

• Postępowanie z bielizną szpitalną

- 1) Bieliznę używaną przez osobę z potwierdzoną infekcją COVID-19 należy traktować jak bieliznę skażoną. Należy obchodzić się z nią ostrożnie, aby uniknąć przedostania się mikroorganizmów do środowiska i kontaktu z odzieżą personelu.
- 2) Należy przestrzegać procedur higienicznych przy obchodzeniu się ze skażoną bielizną, niezależnie od źródła jej pochodzenia.
- 3) Podczas pracy z zabrudzoną bielizną w strefie COVID-19, należy nosić nieprzepuszczalny fartuch z długimi rękawami i podwójne rękawiczki jednorazowe oraz maskę i ochraniacze na obuwiu.
- 4) Czynności należy wykonywać spokojnie, bez gwałtownych ruchów, aby zapobiegać tworzeniu się aerozoli.
- 5) Zabrania się manipulowania przy skażonej bieliźnie (płukania, namaczania, sortowania, układania itp.).
- 6) Brudną bieliznę należy umieścić bezpośrednio w worku rozpuszczalnym.
- 7) Worek rozpuszczalny z zawartością należy umieścić w drugim, jednoznacznie opisanym worku foliowym.
- 8) Brudną bieliznę przechowuje się w wydzielonych wózkach transportowych, które należy poddać dezynfekcji po opróżnieniu.
- 9) Wszelkie powierzchnie oraz przedmioty, z którymi miała kontakt bielizna, należy dezynfekować jednorazową ściereczką nasączoną płynem o działaniu wirusobójczym lub gotową chusteczką dezynfekcyjną.
- 10) Po wykonaniu czynności związanych ze zbieraniem/transportem brudnej bielizny, opuszczając strefę skażoną COVID-19 należy zdjąć środki ochrony indywidualnej w wyznaczonym miejscu i oddać do utylizacji, umieszczając je w odpowiednich pojemnikach na odpady oraz zdezynfekować ręce wirusobójczym alkoholowym płynem lub żelem.
- 11) Należy zdezynfekować gogle/przyłbicę metodą przecierania lub zanurzania.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA RĄK	AHD 1000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
	PHAGO'GEL	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
DEZYNFEKCJA WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ELEMENTÓW TRUDNO DOSTĘPNYCH DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ PRZECIERANIA
	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ELEMENTÓW TRUDNO DOSTĘPNYCH DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ PRZECIERANIA
	SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ELEMENTÓW TRUDNO DOSTĘPNYCH DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ PRZECIERANIA
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	WORKI ROZPUSZCZALNE AQUAFILM	-	WOREK ROZPUSZCZALNY Z BIELIZNĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ W DRUGIM WORKU (FOLIOWYM)

• Postępowanie z bielizną prywatną pacjenta

- 1) Bieliznę prywatną pacjenta z potwierdzoną infekcją COVID-19 należy zewidencjonować, włożyć do worka rozpuszczalnego lub foliowego i szczelnie zamknąć oraz oznakować datą, po której może nastąpić otwarcie.
- 2) Dla bezpieczeństwa należy włożyć worek w jeszcze jeden worek i jednoznacznie oznakować.
- 3) Nie należy potrząsać elementami odzieży.
- 4) Odzież pacjentów z COVID-19 należy przechowywać w magazynie w wydzielonym miejscu.
- 5) Według najnowszych badań, czas przetrwania wirusa SARS-CoV-2 na powierzchniach wynosi maksymalnie 48 godzin, dlatego można:
 - wydać pacjentowi lub rodzinie odzież po 48 godzinach przechowywania
 - wydać pacjentowi lub rodzinie odzież w zamkniętym worku z informacją o dacie, po której można worek otworzyć oraz instrukcją prania (patrz: strona 52)
- 6) Zwyczajne pralki mogą być używane wyłącznie w warunkach domowych do prania osobistej odzieży pacjenta.
- 7) Jeśli odzież pakowana jest w worki rozpuszczalne, należy uzyskać od producenta worków informację, czy nadają się one do użycia w pralkach domowych.
- 8) Pranie musi obejmować użycie odpowiedniego detergentu i gorącej wody o temperaturze 60°C–90°C.
- 9) Jeśli nie można zastosować gorącej wody ze względu na właściwości odzieży, do cyklu prania należy dodać wybielacz lub preparaty przeznaczone do odkażania tekstyliów.
- 10) Należy pouczyć pacjenta lub rodzinę, aby w jednym wsadzie prane były tylko rzeczy pacjenta.
- 11) W przypadku zanieczyszczonej odzieży nienadającej się do prania wodnego należy rekomendować pacjentowi lub rodzinie jej utylizację.
- 12) Wszystkie powierzchnie, z którymi miała styczność odzież pacjenta, należy zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym o działaniu wirusobójczym.
- 13) Po kontakcie z odzieżą pacjenta należy zdjąć środki ochrony indywidualnej i zdezynfekować ręce środkiem alkoholowym o działaniu wirusobójczym.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA RĄK	AHD 1000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
	PHAGO'GEL	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI WORKA
	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI WORKA
	SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI WORKA
	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI WORKA
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI WORKA
PRANIE	TRICHLOROL	POSTAĆ: PROSZEK STĘŻENIE: 0,5% (5 g NA 1 l WODY) CZAS: WG PROGRAMU	UŻYJ JAKO DODATKU DO PROSZKU DO PRANIA
	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 2% CZAS: WG PROGRAMU	UŻYJ JAKO ŚRODKA DO PRANIA PROFESJONALNEGO
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

• Postępowanie z mopami

- 1) Mopy używane do sprzątnięcia w strefie skażonej COVID-19 należy traktować jak skażone. Po użyciu należy obchodzić się z nimi ostrożnie, aby uniknąć przedostania się mikroorganizmów do środowiska i kontaktu z odzieżą personelu.
- 2) Podczas pracy z zanieczyszczonymi mopami należy nosić nieprzepuszczalny fartuch z długimi rękawami, rękawiczki jednorazowe oraz maskę i ochraniacze na obuwiu.
- 3) Czynności należy wykonywać spokojnie, bez gwałtownych ruchów, aby zapobiec tworzeniu się aerozoli.
- 4) Zabrania się manipulowania przy używanych mopach (płukania, namaczania, sortowania, układania itp.).
- 5) Zanieczyszczone mopy należy umieścić bezpośrednio w worku rozpuszczalnym.
- 6) Worek rozpuszczalny z zawartością należy umieścić w drugim, jednoznacznie opisanym worku foliowym.
- 7) Zanieczyszczone mopy należy przechowywać w wydzielonych wózkach transportowych.
- 8) Wózki transportowe należy po opróżnieniu poddać procedurze dezynfekcji, przecierając je jednorazową ściereczką nasączoną płynem o działaniu wirusobójczym lub gotową chusteczką dezynfekcyjną.
- 9) Należy dezynfekować wszelkie powierzchnie oraz przedmioty, z którymi miały kontakt używane mopy.
- 10) Po wykonaniu czynności związanych ze zbieraniem/transportem zanieczyszczonych mopów, opuszczając strefę skażoną COVID-19, należy zdjąć środki ochrony indywidualnej w wyznaczonym miejscu i oddać je do utylizacji, umieszczając w odpowiednich pojemnikach na odpady oraz zdezynfekować ręce wirusobójczym alkoholowym płynem lub żelem dezynfekującym.
- 11) Należy zdezynfekować gogle/przyłbicę metodą przecierania lub zanurzenia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA RĄK	AHD 1000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
	PHAGO'GEL	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
DEZYNFEKCJA WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ELEMENTÓW TRUDNO DOSTĘPNYCH DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ PRZECIERANIA
	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ELEMENTÓW TRUDNO DOSTĘPNYCH DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ PRZECIERANIA
	SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO DO ELEMENTÓW TRUDNO DOSTĘPNYCH DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ PRZECIERANIA
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

2.3 Czas rozpoczęcia procedury mycia i dezynfekcji

- Gdy pacjent, u którego potwierdzono COVID-19, opuści obszar izolacji, należy odczekać 48 godzin przed rozpoczęciem procedury mycia i/lub dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Jeśli odczekanie 48 godzin nie jest możliwe, należy odczekać tak długo, jak to możliwe – minimum 30 min.
 - W przypadku pomieszczeń izolacyjnych z podciśnieniem i 6-krotną wymianą powietrza na godzinę, nie ma potrzeby odczekiwania 48 godzin przed rozpoczęciem procedury mycia i/lub dezynfekcji.
 - W przypadku pomieszczeń bez wymuszonego podciśnienia zamiast zalecanego czasu czekania 48 godzin można je wywietrzyć przez otwarcie okien na 3 godziny, a jeśli to niemożliwe – minimum na 1 godzinę.
 - Podczas prowadzenia procedur mycia i/lub dezynfekcji pomieszczenia okna i/lub drzwi balkonowe powinny pozostać otwarte.
 - W celu przeprowadzenia „wstępnej” dezynfekcji przestrzeni można użyć jednorazowego „naboju” ze środkiem do dezynfekcji rozprowadzanego metodą dyfuzji. Liczbę nabojów należy dopasować do kubatury pomieszczenia.
 - Po przeprowadzeniu manualnego procesu mycia i/lub dezynfekcji należy ponownie wywietrzyć pomieszczenie, np. przez otwarcie okien na 3 godziny, a jeśli to niemożliwe – minimum na 1 godzinę.
- **Mycie i/lub dezynfekcja**
 - 1) Aby nie obniżyć skuteczności środków dezynfekcyjnych, przed użyciem środków dezynfekcyjnych należy umyć zabrudzone lub zakurzone powierzchnie.
 - 2) W przypadku środków myjących i/lub dezynfekujących, aby zapewnić skuteczność dezynfekcji, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta znajdującymi się na etykiecie.
 - 3) W przypadku obecności obciążenia biologicznego używany produkt musi być przebadany w warunkach brudnych i posiadać deklarację producenta o skuteczności w obecności zanieczyszczeń biologicznych.
 - **Dezynfekcja**
 - 1) Wszelkie powierzchnie i wyposażenie należy dezynfekować za pomocą środka skutecznego bójczo co najmniej wobec wirusów otoczkowych.
 - 2) Podczas stosowania środków dezynfekujących należy przestrzegać wskazówek producenta umieszczonych na etykiecie.
 - 3) Należy przestrzegać czasu kontaktu środka dezynfekującego z powierzchnią, który może wynosić od 1 do 15 minut.
 - 4) W przypadku środków dezynfekujących występujących w koncentracji należy przestrzegać instrukcji przygotowania roztworu roboczego.
 - 5) Podczas wykonywania dezynfekcji personel musi przestrzegać procedur bezpiecznego stosowania produktów określonych na etykietach oraz w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych.
 - 6) Roztwory dezynfekujące powinny być świeżo przygotowane, chyba że producent preparatu deklaruje wielodniowy czas aktywności roztworu roboczego.
 - 7) W przypadku wcześniejszego przygotowania roztworu na pojemniku z roztworem należy umieścić datę przydatności i numer serii koncentratu, z którego został przygotowany.
 - 8) Sprzęt do mycia i/lub dezynfekcji należy po użyciu umyć i zdezynfekować, nakładki na mop należy oddać do profesjonalnego prania (patrz: Postępowanie z mopami).
 - 9) Sprzęt do mycia i dezynfekcji, tj. wiadra, pojemniki, należy opróżnić i wyczyścić świeżym roztworem myjącym i/lub dezynfekującym, pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

2.4 Dezynfekcja manualna

• Dezynfekcja manualna powierzchni dotykowych wrażliwych na działanie alkoholu

- 1) Wykonać mycie i/lub dezynfekcję powierzchni preparatem przeznaczonym do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, nanosząc go za pomocą jednorazowych ściereczek lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 2) Nie wolno używać preparatów w formie sprayów, aby uniknąć tworzenia aerozoli.
- 3) W przypadku powierzchni trudno dostępnych, tj.: łączenia materaców, zawiasów, pokręteł, należy wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) W razie potrzeby spłukać wodą zdatną do picia.
- 7) Do powierzchni wykonanych z materiałów tekstylnych stosować preparaty przeznaczone do tego celu (WoolSafe®).

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT Z CERTYFIKATEM WoolSafe®	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3,5% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
AKCESORIA	ATOMIZER SPIENIAJĄCY	-	NALEŻY APLIKOWAĆ PREPARAT BLISKO DEZYNFEKOWANEJ POWIERZCHNI
	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASACZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Jeśli dezynfekcji poddawane są powierzchnie urządzeń elektronicznych, nigdy nie należy używać atomizera. Należy pamiętać, aby przy stosowaniu produktów na bazie alkoholu zadbać także o umycie dezynfekowanej powierzchni, gdyż alkohol nie ma właściwości myjących.

Po myciu i/lub dezynfekcji powierzchnie niewrażliwe można poddać procedurze zamgławiania, ozonowania lub eksponować na światło UV.

Jeśli powierzchnie kontaktują się z żywnością, należy używać produktu biobójczego posiadającego rejestrację do powierzchni kontaktujących się z żywnością, a po upływie czasu dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą zdatną do picia.

2.5 Dezynfekcja drogą powietrzną

1. Sala powinna być umyta/zdezynfekowana, z uwzględnieniem wszystkich powierzchni, sprzętów i wyposażenia

- Nieumyte/niezdezynfekowane powierzchnie mogą znacząco obniżyć skuteczność dezynfekcji drogą powietrzną.
- Do wstępnego mycia i/lub dezynfekcji nie zaleca się używać preparatów na bazie aktywnego chloru i aktywnego tlenu, gdyż mogą one wchodzić w reakcję chemiczną z preparatem używanym do dezynfekcji drogą powietrzną.
- Jeśli istnieje ryzyko kumulacji preparatu na powierzchniach, przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji drogą powietrzną, należy rozważyć ich spłukanie wodą zdatną do picia.

2. Przygotowanie wyposażenia pomieszczenia

- Sprzęt należy rozłożyć w taki sposób, aby z każdej strony zapewnić możliwość dotarcia czynnika dezynfekcyjnego.
- Dezynfekcja drogą powietrzną nie jest przeznaczona do przedmiotów/materiałów higroskopijnych, gdyż powoduje kumulowanie się czynnika w w/w przedmiotach, co osłabia efekt dezynfekcji pomieszczenia. W miarę możliwości tego typu przedmioty należy usunąć z pomieszczenia i poddać innym metodom dekontaminacji.
- Zaleca się, aby wszystkie zestawy sterylne zostały wyniesione z pomieszczenia. W wyjątkowych sytuacjach mogą one pozostać, jeśli są zamknięte w szczelnych szafach lub pojemnikach.
- Przed procedurą dezynfekcji drogą powietrzną należy bezwzględnie wynieść z sali produkty spożywcze, otwarte leki, rośliny, zabawki z powierzchnią chłonną.

3. Przygotowanie i uszczelnienie pomieszczenia

- Kratki wentylacyjne, otwory w drzwiach, nieszczelności w oknach oraz wszelkie inne nieszczelności mogące spowodować wydostawanie się mgły dezynfekującej muszą być uszczelnione/zabezpieczone.
- Brak szczelności pomieszczenia obniży skuteczność procesu dezynfekcji oraz spowoduje wydostawanie się rozpylanego preparatu poza dezynfekowaną przestrzeń, narażając ludzi na kontakt z substancją chemiczną.
- Czujniki przeciwpożarowe należy wyłączyć lub osłonić zabezpieczeniami rekomendowanymi przez producenta czujników.
- W celu zapewnienia odpowiedniej koncentracji środka w pomieszczeniu, na czas dezynfekcji klimatyzacja oraz/lub wentylacja automatyczna/mechaniczna muszą zostać wyłączone.

4. Ustawienie

- W dezynfekowanym pomieszczeniu sprzęt należy ustawić w taki sposób, aby uzyskać swobodny dostęp do okna oraz/lub sterownika wentylacji/klimatyzacji.
- Urządzenie do dezynfekcji drogą powietrzną należy zawsze ustawić w takim miejscu, aby zapewnić jak najlepszą dyfuzję preparatu. Zaleca się pozostawienie ok. dwóch metrów wolnej przestrzeni wokół miejsca, z którego wydostaje się czynnik dezynfekcyjny, aby mgła nie natrafiła na przeszkodę.
- Należy pamiętać o tym, że mgła dezynfekcyjna nie przenika przez materace, pościel, koce; preparat osiądzie na tych powierzchniach, ale nie przeniknie przez ich struktury.

5. Dezynfekcja dodatkowego wyposażenia

- Do sali poddawanej dezynfekcji drogą powietrzną nie należy dostawiać sprzętu z innych pomieszczeń. Dezynfekcja drogą powietrzną powinna dotyczyć pomieszczenia z jego standardowym wyposażeniem.
- W wyznaczonym pomieszczeniu szpitala, np. w „stacji łóżek”, w wyjątkowych sytuacjach można przeprowadzać proces zamgławiania, kumulując wcześniej umyte i zdezynfekowane wyposażenie oraz sprzęty, które wymagają tego procesu, uwzględniając kubaturę pomieszczenia oraz ilość sprzętów.
- W przypadku przeprowadzania dezynfekcji sprzętów i wyposażenia drogą powietrzną, można je także umieścić w szczelnej komorze/namiocie.

6. Dezynfekcja sprzętu elektronicznego

- Sprzęty elektroniczne na czas trwania dezynfekcji drogą powietrzną muszą być odłączone od zasilania.

7. Bezpieczeństwo

- W czasie procesu dezynfekcji drogą powietrzną nikomu nie wolno przebywać w pomieszczeniu. Cały proces składa się z następujących etapów: dyfuzji, czasu kontaktu (dezynfekcji) oraz odzyskiwania pomieszczenia.
- Należy uruchomić urządzenie do dezynfekcji drogą powietrzną i opuścić pomieszczenie.
- Pomieszczenie powinno być zamknięte na klucz. Drzwi od zewnętrznej strony muszą być oklejone (uszczelnione) taśmą.
- Na drzwiach należy umieścić informację o prowadzonym procesie dezynfekcji drogą powietrzną, godzinie zakończenia procesu oraz o zakazie wstępu.
- Na tabliczce powinien znaleźć się kontakt do osoby odpowiedzialnej za proces dezynfekcji drogą powietrzną.
- Po upływie wskazanego przez urządzenie czasu trwania procesu należy uruchomić wentylację w celu „odzyskania pomieszczenia”.

8. Odzyskiwanie pomieszczenia

- W sytuacji braku możliwości uruchomienia wentylacji z zewnątrz należy wejść do pomieszczenia używając środków ochrony indywidualnej w celu otwarcia okna, uruchomienia wentylacji lub zdjęcia zabezpieczeń na kratkach wentylacyjnych.
- Należy do minimum ograniczyć czas przebywania w pomieszczeniu po dezynfekcji drogą powietrzną, tj.: czas potrzebny na otwarcie okna, włączenie wentylacji, zdjęcie zabezpieczeń z kratki wentylacyjnej.
- Czas odzyskiwania pomieszczenia to, od kilku do kilkunastu wymian powietrza, w zależności od wydajności wentylacji. Jeśli do wentylacji używamy okna – minimalny czas to 30 minut.
- Po czasie fumigacji, kontaktu i odzyskiwania, pomieszczenie jest gotowe do użycia i nie wymaga dodatkowych procedur mycia i dezynfekcji lub wycierania.
- Wszelkie powierzchnie znajdujące się w sali, mogące mieć kontakt z żywnością, muszą być zmyte wodą zdatną do picia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA DROGĄ POWIETRZNĄ	O2SAFE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 2 LUB 3 h DOZA: 12 ml/m ³	PRODUKT KOMPATYBILNY Z URZĄDZENIAMI LINII PHILEAS
DOSTĘPNE URZĄDZENIA	PHILEAS 25	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 12 ml/m ³ CZAS: 2 LUB 3 h
	PHILEAS 75	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 160 m ³	DOZA: 12 ml/m ³ CZAS: 2 LUB 3 h
	PHILEAS 250	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 800 m ³	DOZA: 12 ml/m ³ CZAS: 2 LUB 3 h
	PHILEAS GENIUS	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 10 m ³	DOZA: 12 ml/m ³ CZAS: 2 LUB 3 h
	STERISAFE-PRO	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 130 m ³	CZAS: ZALEŻNY OD KUBATURY
DEZYNFEKCJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Dopuszcza się zastosowanie dezynfekcji drogą powietrzną jako wstępnej metody dekontaminacji przestrzeni, nie należy jej jednak traktować jako zamiennika dezynfekcji manualnej, a jedynie jako dodatkowe zabezpieczenie personelu sprząającego przed drobnoustrojami „zawieszonymi” w powietrzu. Po takiej „wstępnej” dezynfekcji należy przeprowadzić kompleksowe mycie i/lub dezynfekcję wszystkich powierzchni a następnie powtórzyć proces dezynfekcji drogą powietrzną.

3. DEZYNFEKCJA SPRZĘTU

3.1 Dezynfekcja drobnego sprzętu elektronicznego

- **Dezynfekcja telefonów z ekranem dotykowym**

- 1) Wyjąć telefon z pokrowca, jeśli pokrowiec jest wykonany z materiału nasiąkliwego, należy rozważyć jego wyrzucenie. Jeśli pokrowiec nadaje się do mycia i/lub dezynfekcji, należy przeprowadzić procedurę dezynfekcji jak poniżej.
- 2) Należy wykonać dezynfekcję lub mycie i dezynfekcję jednocześnie obu powierzchni telefonu oraz jego boków za pomocą ściereczki jednorazowej nasączonej preparatem do dezynfekcji.
- 3) W przypadku telefonów z klawiaturą należy zwrócić szczególną uwagę na okolice przycisków i klawiatury.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Telefony można poddawać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną po wykonaniu mycia i/lub dezynfekcji manualnej.

Telefony można poddać procedurze ozonowania lub ekspozycji na światło UV, należy jednak pamiętać, że światło UV może uszkodzić przedmioty plastikowe i gumowe.

• **Dezynfekcja pilotów do telewizora, klimatyzacji, światła, krótkofalówek i telefonów stacjonarnych**

- 1) Wyjąć baterie.
- 2) Wykonać dezynfekcję lub mycie i dezynfekcję jednocześnie wszystkich powierzchni pilota oraz jego boków za pomocą ściereczki jednorazowej nasączonej preparatem do dezynfekcji lub gotowej chusteczki do dezynfekcji powierzchni wrażliwych.
- 3) Należy zwrócić szczególną uwagę na okolice przycisków. Jeżeli to możliwe, rozmontować urządzenie w celu lepszej dezynfekcji drobnych elementów.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Piloty można poddawać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną po wykonaniu mycia i/lub dezynfekcji manualnej.

Piloty można poddać procedurze ozonowania lub ekspozycji na światło UV, należy jednak pamiętać, że światło UV może uszkodzić przedmioty plastikowe i gumowe.

3.2 Dezynfekcja materaców

• Dezynfekcja materaców nienasiąkliwych

- 1) Ocenić materac pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń (przetarć, pęknięć).
- 2) Jeśli materac jest uszkodzony, nie należy używać go ponownie, należy poddać go utylizacji.
- 3) Wykonać mycie, następnie dezynfekcję lub mycie i dezynfekcję obu powierzchni materaca oraz jego boków.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) Materace do inkubatorów należy po dezynfekcji zmyć wodą zdatną do picia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Materace nienasiąkliwe można poddawać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną ozonowania lub ekspozycji na światło UV po wykonaniu mycia i/lub dezynfekcji manualnej.

Materac poddawany procesowi dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu, ekspozycji na światło UV należy ułożyć na łóżku w taki sposób, aby czynnik dezynfekcyjny dotarł na każdą jego powierzchnię, jednocześnie nie blokując dostępu do stelaża łóżka, który również powinien zostać poddany dezynfekcji drogą powietrzną.

• Dezynfekcja materaców nasiąkliwych

- 1) Należy unikać dezynfekcji materacy nasiąkliwych, gdyż może ona okazać się nieskuteczna ze względu na chłonność dezynfekowanego materiału.
- 2) Ocenić materac pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń. Jeśli materac jest uszkodzony, nie należy używać go ponownie, należy poddać go utylizacji.
- 3) Wykonać dezynfekcję dostępnych powierzchni materaca oraz jego boków przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji tkanin i tapicerki posiadających certyfikat WoolSafe®.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT Z CERTYFIKATEM WoolSafe®	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO
	OXIVIR EXCEL PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3,5% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	ATOMIZER SPIENIAJĄCY	-	NALEŻY APLIKOWAĆ PREPARAT BLISKO DEZYNFEKOWANEJ POWIERZCHNI
	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASACZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Materace pokryte tkaninami, zanieczyszczone materiałem biologicznym lub zaplamione, należy po dezynfekcji wstępnej poddać procedurze profesjonalnego prania i dezynfekcji.

Materace nasiąkliwe można poddać procedurze ozonowania lub eksponować na światło UV po wstępnym ich wyczyszczeniu.

Należy mieć na uwadze, że ozonowanie powierzchni nasiąkliwych osłabia efekt dezynfekcji pozostałych powierzchni w pomieszczeniu poddawanemu ozonowaniu.

Materaców nasiąkliwych nie należy poddawać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną.

3.3 Dezynfekcja ram łóżek

- 1) Wykonać dezynfekcję lub mycie i dezynfekcję ramy łóżka preparatem przeznaczonym do powierzchni (uwzględniając wrażliwość powierzchni na alkohol), nanosząc go za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 2) Zdezynfekować pilot sterujący łóżkiem za pomocą ściereczki nasączonej preparatem dezynfekcyjnym lub gotowej do użycia chusteczki dezynfekcyjnej.
- 3) W przypadku powierzchni trudno dostępnych, tj. zawiasów, pokręteł, wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Ramy łóżka można poddać procedurze zamgławiania, ozonowania lub ekspozycji na światło UV po przeprowadzeniu manualnej procedury mycia i/lub dezynfekcji.

Należy pamiętać, że światło UV może uszkodzić przedmioty plastikowe i gumowe.

3.4 Dezynfekcja mebli wypoczynkowych, foteli i krzeseł

- **Dezynfekcja mebli nienasiąkliwych**

- 1) Ocenić tapicerkę mebla pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń. Jeśli tapicerka jest uszkodzona nie należy używać mebla ponownie, należy poddać go renowacji (wymiana tapicerki) lub utylizacji.
- 2) Wykonać dezynfekcję lub mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni mebla.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI	LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Meble tapicerowane nienasiąkliwe można poddawać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowania lub eksponować na światło UV po wykonaniu mycia i/lub dezynfekcji manualnej.

• Dezynfekcja mebli nasiąkliwych

- 1) Należy unikać dezynfekcji mebli nasiąkliwych, gdyż może ona okazać się nieskuteczna ze względu na chłonność dezynfekowanego materiału.
- 2) Ocenić tapicerkę mebla pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń. Jeśli tapicerka jest uszkodzona, nie należy używać mebla ponownie, należy poddać go renowacji (wymiana tapicerki) lub utylizacji.
- 3) Wykonać dezynfekcję dostępnych powierzchni mebla przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji tkanin i tapicerki posiadających certyfikat WoolSafe®.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT Z CERTYFIKATEM WoolSafe®	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO
	OXIVIR EXCEL PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3,5% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	ATOMIZER SPIENIAJĄCY	-	NALEŻY APLIKOWAĆ PREPARAT BLISKO DEZYNFEKOWANEJ POWIERZCHNI
	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Meble pokryte tkaninami zanieczyszczone materiałem biologicznym lub zaplamione należy po dezynfekcji poddać procedurze profesjonalnego prania i dezynfekcji.

Mebli tapicerowanych tkaninami nasiąkliwymi nie należy poddawać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną.

Meble nasiąkliwe można poddać procedurze ozonowania lub ekspozycji na światło UV.

Należy mieć na uwadze, że ozonowanie powierzchni nasiąkliwych osłabia efekt dezynfekcji pozostałych powierzchni w pomieszczeniu poddawanych ozonowaniu.

3.5 Dezynfekcja podłóg

- **Dezynfekcja podłóg zmywalnych**

- 1) Należy ocenić podłogi pod kątem obecności ewentualnych widocznych zanieczyszczeń biologicznych.
- 2) Jeśli podłoga jest zanieczyszczona materiałem biologicznym, należy dokonać dezaktywacji plamy biologicznej zgodnie z opisem poniżej (patrz punkt: Postępowanie z plamą materiału biologicznego).
- 3) Wykonać mycie z dezynfekcją powierzchni podłogi przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych.
- 4) Stosować mopy jednego kontaktu.
- 5) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 6) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI	TASKI SPRINT DEGERM	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1%	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	LYSOFORMIN RAPID	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2,5% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	LYSOFORMIN 3000	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
AKCESORIA	MOPY JEDNEGO KONTAKTU	-	-

UWAGA!

Powierzchnie podłóg po umyciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowania lub ekspozycji na światło UV.

Mopy po użyciu należy zapakować w rozpuszczalny worek i postępować z nimi, jak opisano wyżej (patrz: Postępowanie z mopami).

• Dezynfekcja dywanów

- 1) Należy unikać dezynfekcji dywanów, gdyż może ona okazać się nieskuteczna ze względu na chłonność dezynfekowanego materiału.
- 2) Ocenić dywan pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń. Jeśli dywan jest uszkodzony, należy rozważyć poddanie go utylizacji.
- 3) Wykonać dezynfekcję powierzchni dywanu przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji tkanin, tapicerki i dywanów posiadających certyfikat WoolSafe®.
- 4) W przypadku dużych zabrudzeń i plam należy po wstępnej dezynfekcji oddać dywan do profesjonalnego czyszczenia.
- 5) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 6) Odczekać do wyschnięcia.
- 7) Jeśli istnieje taka możliwość, pozostawić na 48 godzin.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT Z CERTYFIKATEM WoolSafe®	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO
	OXIVIR EXCEL PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3,5% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	ATOMIZER SPIENIAJĄCY	-	NALEŻY APLIKOWAĆ PREPARAT BLISKO DEZYNFEKOWANEJ POWIERZCHNI
	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Dywany zabrudzone materiałem biologicznym lub z plamami należy po wstępnej dezynfekcji poddać procedurze profesjonalnego czyszczenia.

Dywanów nie należy poddawać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną.

Dywan można poddać procedurze ozonowania lub eksponować na światło UV, należy jednak pamiętać, że podłoga znajdująca się pod dywanem nie ulega wówczas ekspozycji na czynnik dezynfekujący.

Zaleca się po przeprowadzonej dezynfekcji wypranie dywanu przy użyciu odkurzacza piorącego.

3.6 Dezynfekcja ścian

- **Dezynfekcja ścian zmywalnych (pokrytych kafłami, tarketem, szkłem, farbą wodoodporną zmywalną)**
 - 1) Ocenic powłokę pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń. Jeśli powłoka jest uszkodzona, należy ją uzupełnić.
 - 2) Wykonać dezynfekcję powierzchni ściany przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych, stosując mopów jednego kontaktu.
 - 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
 - 4) Odczekać do wyschnięcia.
 - 5) Dla uzupełnienia dezynfekcji manualnej można zastosować dezynfekcję przestrzeni drogą powietrzną.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2,5% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	TASKI SPRINT DEGERM	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1%	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	LYSOFORMIN RAPID	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	OXIVIR EXCEL	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 1 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYSZCZYWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Zabrudzoną/zakurzoną ścianę należy po dezynfekcji umyć przy użyciu detergentu, usuwając zanieczyszczenie manualnie.

Ściany po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub eksponować na światło UV. Należy pamiętać, że ściana znajdująca się pod tablicami, plakatami i innymi elementami wiszącymi nie ulega ekspozycji na czynnik dezynfekujący.

W przypadku braku możliwości użycia mopów należy aplikować środek do dezynfekcji za pomocą urządzenia rozpylającego/zraszającego przy szczególnie restrykcyjnym stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

• **Dezynfekcja ścian niezmywalnych (pokrytych farbą emulsyjną, akrylową, tapetą itp.)**

- 1) Ocenić powłokę pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń. Jeśli powłoka jest uszkodzona, należy ją uzupełnić.
- 2) Wykonać dezynfekcję powierzchni ściany przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych, nanosząc je za pomocą jednorazowych nasączonych preparatem do dezynfekcji ściereczek z włókniny.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.
- 5) Dla uzupełnienia dezynfekcji manualnej można zastosować dezynfekcję przestrzeni drogą powietrzną.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2,5% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	TASKI SPRINT DEGERM	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1%	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	LYSOFORMIN RAPID	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
	OXIVIR EXCEL	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 1 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ MOPÓW JEDNEGO KONTAKTU
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
DEZYNFEKCJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Zabrudzoną/zakurzoną ścianę należy po dezynfekcji umyć przy użyciu detergentu, usuwając zanieczyszczenie manualnie.

Ściany po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV. Należy pamiętać, że ściana znajdująca się pod tablicami, plakatami i innymi elementami wiszącymi nie ulega ekspozycji na czynnik dezynfekujący.

W przypadku braku możliwości użycia mopów należy aplikować środek do dezynfekcji za pomocą urządzenia rozpylającego/zraszającego przy szczególnie restrykcyjnym stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

• **Dezynfekcja ścian niezmywalnych (pokrytych farbą emulsyjną, akrylową, tapetą itp.)**

- 1) Ocenić powłokę pod kątem obecności ewentualnych uszkodzeń. Jeśli powłoka jest uszkodzona, należy ją uzupełnić.
- 2) Wykonać dezynfekcję powierzchni ściany przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych, nanosząc je za pomocą jednorazowych nasączonych preparatem do dezynfekcji ściereczek z włókniny.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.
- 5) Dla uzupełnienia dezynfekcji manualnej można zastosować dezynfekcję przestrzeni drogą powietrzną.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2,5% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TASKI SPRINT DEGERM	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1%	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	LYSOFORMIN RAPID	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Zabrudzoną/zakurzoną ścianę należy po dezynfekcji umyć przy użyciu detergentu, usuwając zanieczyszczenie. Ściany po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV. Należy pamiętać, że ściana znajdująca pod tablicami, plakatami i innymi elementami wiszącymi nie ulega ekspozycji na czynnik dezynfekujący.

3.7 Dezynfekcja ciągów komunikacyjnych

• Dezynfekcja korytarzy

- 1) Wykonać dezynfekcję powierzchni dotykowych, tj. klamek, włączników światła, poręczy, przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych nasączonych preparatem do dezynfekcji ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję drzwi i parapetów przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny.
- 3) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni ścian i podłóg przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych, nanosząc je za pomocą mopów jednego kontaktu.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) Dla uzupełnienia dezynfekcji manualnej można zastosować dezynfekcję przestrzeni drogą powietrzną.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI DUŻYCH	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2,5% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TASKI SPRINT DEGERM	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1%	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	LYSOFORMIN RAPID	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁOKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCYJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Przestrzenie korytarzy po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV. Należy pamiętać, że procedura ta wymaga odpowiedniej ilości preparatu i czasu dezynfekcji, które wynikają z kubatury ciągów komunikacyjnych.

Przestrzenie korytarzy można poddać dezynfekcji przy użyciu produktów w postaci jednorazowych aerozoli pod warunkiem zastosowania ich w liczbie adekwatnej do ich kubatury.

W przypadku braku możliwości użycia mopów aplikować środek do dezynfekcji za pomocą urządzenia rozpylającego/zraszającego przy szczególnie restrykcyjnym stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

• Dezynfekcja klatek schodowych

- 1) Wykonać dezynfekcję powierzchni dotykowych, tj. klamek, włączników światła, poręczy, przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję drzwi oraz parapetów przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny.
- 3) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni ścian i podłóg przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni dużych, nanosząc je za pomocą mopów jednego kontaktu.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) Dla uzupełnienia dezynfekcji manualnej można zastosować dezynfekcję przestrzeni drogą powietrzną.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI DUŻYCH	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) czas: 5 min, STĘŻENIE: 2,5% (WARUNKI BRUDNE)	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TASKI SPRINT DEGERM	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1%	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	LYSOFORMIN RAPID	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCYJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Przestrzenie klatek schodowych po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV. Należy pamiętać, że procedura to wymaga odpowiedniej ilości preparatu i czasu dezynfekcji, które wynikają z kubatury klatki schodowej.

Przestrzenie klatek schodowych można poddać dezynfekcji przy użyciu produktów w postaci jednorazowych aerozoli pod warunkiem zastosowania ich w liczbie adekwatnej do ich kubatury.

W przypadku braku możliwości użycia mopów należy aplikować środek do dezynfekcji za pomocą urządzenia rozpylającego/zraszającego przy szczególnie restrykcyjnym stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

• Dezynfekcja wind

- 1) Wykonać dezynfekcję powierzchni dotykowych, tj. klamek, przycisków sterujących, powierzchni drzwi, przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję drzwi i ścian wewnętrznych kabiny przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek.
- 3) Wykonać mycie i dezynfekcję podłogi w kabinie przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą mopa.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) Dla uzupełnienia dezynfekcji manualnej można zastosować dezynfekcję przestrzeni drogą powietrzną.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH ŚRODKI POSIADAJĄCE W SKŁADZIE KOMPONENTY MYJĄCE MOGĄ POZOSTAWIAĆ SMUGI NA POWIERZCHNIACH ZE STALI
	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH ŚRODKI POSIADAJĄCE W SKŁADZIE KOMPONENTY MYJĄCE MOGĄ POZOSTAWIAĆ SMUGI NA POWIERZCHNIACH ZE STALI
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE ŚRODKI POSIADAJĄCE W SKŁADZIE KOMPONENTY MYJĄCE MOGĄ POZOSTAWIAĆ SMUGI NA POWIERZCHNIACH ZE STALI
	TASKI SPRINT DEGERM	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1%	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH ŚRODKI POSIADAJĄCE W SKŁADZIE KOMPONENTY MYJĄCE MOGĄ POZOSTAWIAĆ SMUGI NA POWIERZCHNIACH ZE STALI
	LYSOFORMIN RAPID	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 0,25%	UŻYWAJ MOPA JEDNEGO KONTAKTU, CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH ŚRODKI POSIADAJĄCE W SKŁADZIE KOMPONENTY MYJĄCE MOGĄ POZOSTAWIAĆ SMUGI NA POWIERZCHNIACH ZE STALI
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNIOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Kabiny wind po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub eksponować na światło UV. Należy pamiętać, że procedura ta wymaga wyłączenia windy z użycia na czas rozpylania produktu, dezynfekcji i odzyskiwania.

3.8 Dezynfekcja drobnego wyposażenia medycznego

- **Dezynfekcja drobnego wyposażenia zmywalnego**

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek.
- 2) Jeśli wyposażenie można zanurzyć w roztworze do dezynfekcji, należy takie rozwiązanie rozważyć.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA DROBNEGO SPRZĘTU PRZEZ PRZECIERANIE	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASACZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	CHUSTECZKI JEDNORAZOWE MEDILAB	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCYJA DROBNEGO SPRZĘTU PRZEZ ZANURZANIE	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 1% (WARUNKI CZYSTE) CZAS: 5 min, STĘŻENIE: 2,5% (WARUNKI BRUDNE)	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ROBOCZY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRZEDMIOTY MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE ZANURZONE W ROZTWORZE
	DDN 9	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,5%	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ROBOCZY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRZEDMIOTY MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE ZANURZONE W ROZTWORZE
	ENZYMEX L9	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 10 min, STĘŻENIE: 0,5%	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ROBOCZY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRZEDMIOTY MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE ZANURZONE W ROZTWORZE
	LYSOFORMIN 3000	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 15 min, STĘŻENIE: 0,25%	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ROBOCZY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRZEDMIOTY MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE ZANURZONE W ROZTWORZE
AKCESORIA	WANNA DO DEZYNFEKCYJI	-	WYBIERZ WANNE O ODPOWIEDNIEJ POJEMNOŚCI Z SITEM I POKRYWĄ WANNA POWINNA BYĆ PRAWIDŁOWO OZNAKOWANA: NAZWĄ PREPARTU, STĘŻENIEM, DATĄ I GODZINĄ PRZYGOTOWANIA ROZTWORU

UWAGA!

Dobór produktu do dezynfekcji powinien uwzględniać materiał, z którego wykonany jest wyrób medyczny. Produkt powinien posiadać rejestrację do dezynfekcji wyrobów medycznych.

Jeśli sprzęt nie nadaje się do zanurzania, miejsca trudno dostępne, np. zawiasy, łączniki, należy spryskać z bliska (unikając tworzenia aerozolu) preparatem dezynfekcyjnym i pozostawić do wyschnięcia.

• **Dezynfekcja drobnego wyposażenia materiałowego**

- 1) Przedmiot, tj. mankiet do mierzenia ciśnienia, pas do KTG, pasy do przypinania pacjenta, zdezynfekować, nanosząc środek przeznaczony do dezynfekcji materiałów i tkanin posiadający certyfikat WoolSafe®.
- 2) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 3) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT Z CERTYFIKATEM WoolSafe®	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO
	OXIVIR EXCEL PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3,5% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	ATOMIZER SPIENIAJĄCY	-	NALEŻY APLIKOWAĆ PREPARAT BLISKO DEZYNFEKOWANEJ POWIERZCHNI
	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Należy unikać nasączania przedmiotu materiałowego środkiem dezynfekcyjnym.

Produkt powinien posiadać rejestrację do dezynfekcji wyrobów medycznych.

Preparat powinien posiadać certyfikat WoolSafe®.

Wyroby medyczne wykonane z materiałów można po myciu i/lub dezynfekcji poddać procedurze ozonowania lub ekspozycji na światło UV. Należy pamiętać, że ekspozycja na światło UV może wpływać niekorzystnie na przedmioty z gumy i plastiku.

• **Dezynfekcja drobnego wyposażenia elektronicznego**

- 1) Wyrób medyczny zdezynfekować, nanosząc produkt za pomocą jednorazowej ściereczki na powierzchnię ekranu i obudowy lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 3) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Jeśli to możliwe, urządzenie poddawane dezynfekcji powinno zostać odłączone od źródeł zasilania na czas prowadzenia procesu dezynfekcji.

Nie używać atomizera na powierzchni urządzeń elektronicznych, tj. klawiatury komputerów, przyciski, wtyczki kabli.

Jeśli dezynfekowane urządzenia elektroniczne są wyrobami medycznymi, np. kardiomonitor, USG, preparat powinien posiadać rejestrację jako wyrób medyczny (posiadać znak CE).

Urządzenia elektroniczne po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu pod warunkiem odłączenia ich od zasilania.

• **Dezynfekcja drobnego wyposażenia nadającego się do zanurzenia**

- 1) Przygotować roztwór roboczy środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją producenta.
- 2) Wyrób medyczny umieścić w roztworze, tak aby był całkowicie zanurzony.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Wyjąć wyrób medyczny z roztworu, w razie potrzeby opłukać wodą.
- 5) Pozostawić do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU PRZEZ ZANURZENIE	ENZYMEX L9	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 10 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
	DDN 9	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 0,5% CZAS: 15 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
	NEODISHER SEPTO ACTIVE	POSTAĆ: GRANULAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 15 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
	OXIVIR PLUS	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
AKCESORIA	WANNA DEZYNFEKCYJNA	POJEMNOŚĆ: MINIMUM 10 l	PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM OZNAKOWANIU WANNY

UWAGA!

Nie należy zanurzać sprzętu, jeśli producent urządzenia na to nie pozwala.

Jeśli dezynfekowane urządzenia są wyrobami medycznymi, preparat powinien posiadać rejestrację jako wyrób medyczny.

Urządzenia dezynfekowane poprzez zanurzenie można po myciu i/lub dezynfekcji oraz dokładnym wysuszeniu poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

3.9 Dezynfekcja zabawek

• Dezynfekcja zabawek zmywalnych

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 3) Odczekać do wyschnięcia.
- 4) Spłukać wodą zdatną do picia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA ZABAWEK	SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	SUMA ALCOHOL WIPES	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Dobór produktu do dezynfekcji powinien uwzględniać materiał, z którego wykonana jest zabawka. Produkt powinien posiadać deklarację producenta o przeznaczeniu do dezynfekcji zabawek.

Miejsca trudno dostępne, np. zawiasy, łączniki, spryskać z bliska preparatem dezynfekcyjnym i pozostawić do wyschnięcia.

Zabawki po myciu i/lub dezynfekcji można poddać dezynfekcji drogą powietrzną, procedurze ozonowania lub ekspozycji na światło UV. Po zamgławianiu należy zabawkę spłukać wodą zdatną do picia.

Należy używać środka dezynfekującego, który jest bezpieczny dla dzieci.

Do dezynfekcji, ze względu na specyficzne użytkowanie zabawek, należy stosować preparat przeznaczony do powierzchni kontaktujących się z żywnością.

• Dezynfekcja zabawek materiałowych/pluszowych

- 1) Należy unikać dezynfekcji zabawek nasiąkliwych, gdyż może ona okazać się nieskuteczna ze względu na chłonność dezynfekowanego materiału.
- 2) Zabawkę należy poddać procedurze prania z użyciem środka dezynfekcyjnego.
- 3) Odczekać do wyschnięcia.
- 4) Zabawkę dokładnie wywietrzyć.

UWAGA!

W przypadku zabrudzenia materiałem biologicznym zabawkę należy poddać utylizacji.

Należy unikać nasączenia zabawki materiałowej/pluszowej środkiem dezynfekcyjnym.

Zabawki materiałowe/pluszowe można po praniu poddać procedurze ozonowania lub ekspozycji na światło UV.

• Dezynfekcja zabawek elektronicznych

- 1) Zabawkę zdezynfekować, nanosząc produkt za pomocą jednorazowej ściereczki lub gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 3) Odczekać do wyschnięcia.
- 4) Zabawkę przetrzeć ściereczką nasączoną wodą zdatną do picia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA ZABAWEK ELEKTRONICZNYCH	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

3.10 Dezynfekcja mebli

• Dezynfekcja mebli zmywalnych

- 1) Wykonać dezynfekcję powierzchni poziomych i pionowych oraz uchwytów przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni wewnętrznych przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA MEBLI	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Meble po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

Jeśli meble stanowią wyposażenie przeznaczone do kontaktu z żywnością, należy używać produktu biobójczego posiadającego rejestrację do powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Jeśli meble są powierzchniami kontaktującymi się z żywnością należy po upływie czasu dezynfekcji spuścić je wodą zdatną do picia.

• Dezynfekcja mebli delikatnych

- 1) Wykonać dezynfekcję powierzchni poziomych i pionowych oraz uchwytów przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni wewnętrznych przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA MEBLI	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Meble po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

Jeśli meble są wykonane z drewna pokrytego lakierem, należy stosować produkty posiadające deklarację do dezynfekcji powierzchni lakierowanych.

Meble plastikowe należy dezynfekować produktami przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu.

Jeśli meble stanowią wyposażenie przeznaczone do kontaktu z żywnością, należy używać produktu biobójczego posiadającego rejestrację do powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Jeśli meble przeznaczone są do kontaktu z żywnością, należy po upływie czasu dezynfekcji spłukać ich powierzchnie wodą zdatną do picia.

3.11 Dezynfekcja toalet

• Dezynfekcja toalet stacjonarnych

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznych toalety oraz deski sedesowej przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych biologicznie, nanosząc je za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub korzystając z chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję przycisku spłuczki, najbliższego otoczenia, poręczy, włącznika światła przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych biologicznie, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z chusteczek dezynfekcyjnych.
- 3) Wykonać dezynfekcję powierzchni wewnętrznych toalety przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji toalet nanosząc je bezpośrednio na powierzchnie.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) Zamknąć deskę sedesową, spuścić wodę.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA TOALET	CHLOR - CLEAN WIPES	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE CHUSTECZKĘ PO UŻYCIU NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	CHLOR - CLEAN	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	SUMA TAB D4	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TITAN CHLOR PLUS TABLETS	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
DEZYNFEKCJA OTOCZENIA TOALETY	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT DO DEZAKTYWACJI PŁAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE PRODUKT DO DEZAKTYWACJI PŁAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE WIPE DO DEZAKTYWACJI PŁAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNIOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Jeśli elementy toalety są wykonane z plastiku, należy stosować produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu.

W przypadku powierzchni zanieczyszczonych moczem nie należy stosować produktów na bazie chloru.

W przypadku konieczności dezaktywacji płam moczu należy stosować produkty posiadające deklarację do dezaktywacji płam moczu (na bazie nadtlenu wodoru).

Toalety po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowania lub ekspozycji na światło UV.

• Dezynfekcja toalet przenośnych

- 1) Usunąć wiaderko wymienne i wykonać jego mycie oraz dezynfekcję zgodnie z obowiązującą procedurą w myjni-dezynfektorze z użyciem odpowiedniego programu.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni zewnętrznych toalety przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych biologicznie, nanosząc je za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA TOALET	CHLOR - CLEAN WIPES	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE CHUSTECZKĘ PO UŻYCIU NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	CHLOR - CLEAN	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	SUMA TAB D4	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TITAN CHLOR PLUS TABLETS	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
DEZYNFEKCJA OTOCZENIA TOALETY	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT DO DEZAKTYWACJI PLAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE PRODUKT DO DEZAKTYWACJI PLAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE WIPE DO DEZAKTYWACJI PLAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Jeśli elementy toalety wykonane są z plastiku, należy stosować produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi.

W przypadku powierzchni zanieczyszczonych moczem nie należy stosować produktów na bazie chloru.

Toalety po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

3.12 Dezynfekcja wyposażenia łazienki

• Dezynfekcja umywalki

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznych umywalki przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub przy użyciu gotowych chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Wykonać mycie i dezynfekcję wylewki, kurka, dozowników na mydło i środek do dezynfekcji oraz najbliższego otoczenia przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub przy użyciu gotowych chusteczek dezynfekcyjnych.
- 3) Wykonać dezynfekcję powierzchni wewnętrznych umywalki przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni nanosząc je bezpośrednio na powierzchnie za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub przy użyciu gotowych chusteczek dezynfekcyjnych.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) Do odpływu umywalki wlać środek do dezynfekcji odpływów zlewów wykazujący skuteczność w usuwaniu biofilmu.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA UMYWALEK	CHLOR - CLEAN WIPES	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE CHUSTECZKĘ PO UŻYCIU NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	CHLOR - CLEAN	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	SUMA TAB D4	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TITAN CHLOR PLUS TABLETS	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
DEZYNFEKCYJA OTOCZENIA UMYWALKI	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Umywalki po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

W przypadku obecności w umywalce zanieczyszczeń biologicznych należy stosować produkty posiadające deklarację do dezaktywacji zanieczyszczeń biologicznych.

• Dezynfekcja kabin prysznicowych

- 1) Wykonać mycie i/lub dezynfekcję powierzchni zewnętrznych kabiny prysznicowej przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Wykonać mycie i/lub dezynfekcję słuchawki prysznicowej, dozowników na mydło, poręczy itp. przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych chusteczek dezynfekcyjnych.
- 3) Wykonać dezynfekcję powierzchni wewnętrznych kabiny i brodzika przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je bezpośrednio na powierzchnie.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.
- 6) Do odpływu brodzika wlać środek do dezynfekcji odpływów zlewów wykazujący skuteczność w usuwaniu biofilmu.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA PRYSZNICOWA	CHLOR - CLEAN WIPES	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE CHUSTECZKĘ PO UŻYCIU NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	CHLOR - CLEAN	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	SUMA TAB D4	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TITAN CHLOR PLUS TABLETS	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
DEZYNFEKCYJA ELEMENTÓW KABINY	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Kabiny prysznicowe po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

W przypadku obecności w kabinie prysznicowej zanieczyszczeń biologicznych należy stosować produkty posiadające deklarację do dezaktywacji zanieczyszczeń biologicznych.

• Dezynfekcja wanny

- 1) Wykonać mycie i/lub dezynfekcję powierzchni zewnętrznych wanny przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych.
- 2) Wykonać mycie i/lub dezynfekcję zewnętrznych powierzchni dysz, wylewki, kranu, dozowników na mydło, poręczy przy użyciu produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub przy użyciu gotowych chusteczek dezynfekcyjnych.
- 3) W przypadku wanien z hydromasażem wykonać dezynfekcję wanny wraz z obiegiem (jeśli posiada) przy użyciu produktu do dezynfekcji wanien, przygotowując roztwór i uruchamiając tryb zapewniający przepływ produktu przez dysze środkiem wykazującym skuteczność w usuwaniu biofilmu.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA WANIEŃ	CHLOR - CLEAN WIPES	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE CHUSTECZKĘ PO UŻYCIU NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	CHLOR - CLEAN	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	SUMA TAB D4	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	TITAN CHLOR PLUS TABLETS	POSTAĆ: TABLETKI CZAS: 15 min/1000 ppm	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
DEZYNFEKCJA OTOCZENIA WANNY	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Wanny po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze zamgławiania, ozonowania lub ekspozycji na światło UV.

W przypadku obecności w wannie zanieczyszczeń biologicznych należy stosować produkty posiadające deklarację do dezaktywacji zanieczyszczeń biologicznych.

3.13 Dezynfekcja przedmiotów służących do transportu pacjenta

• Dezynfekcja wózka inwalidzkiego

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni zmywalnych preparatem przeznaczonym do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub używając gotowych chusteczek do dezynfekcji.
- 2) W przypadku powierzchni trudno dostępnych, tj. łączenia siedziska, zawiasów, pokręteł, wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 3) W przypadku powierzchni siedziska wykonanej z materiału należy zastosować produkt do dezynfekcji powierzchni wykonanych z materiałów i tkanin, posiadający certyfikat WoolSafe®.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI MATERIAŁOWYCH	OXIVIR PLUS SPRAY PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO DO POWIERZCHNI TRUDNO DOSTĘPNYCH UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 2% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR PLUS PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT WoolSafe®	POSTAĆ: KONCENTRAT STĘŻENIE: 3,5% CZAS: 5 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	ATOMIZER SPIENIAJĄCY	-	NALEŻY APLIKOWAĆ PREPARAT BLISKO DEZYNFEKOWANEJ POWIERZCHNI
	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Produkty do dezynfekcji elementów wykonanych z tkanin i materiałów powinny posiadać certyfikat WoolSafe®.

W przypadku dezynfekcji powierzchni elementów elektronicznych, nie należy używać atomizera.

Wszelkie powierzchnie po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub eksponować na światło UV.

• Dezynfekcja wózków transportowych

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni zmywalnych preparatem przeznaczonym do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 2) W przypadku powierzchni trudno dostępnych, tj. łączenia materaca, zawiasów, pokręteł, wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	LYSOFORMIN PLUS - SCHAUM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCJA BEZ UDZIAŁU URZĄDZENIA	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 40 m ³	DOZA: 50 ml CZAS: 1 h
	NDP AIR TOTAL + GREEN CE	MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA: 150 m ³	DOZA: 300 ml CZAS: 1 h

UWAGA!

Wszelkie powierzchnie po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

3.14 Dezynfekcja przedmiotów mających kontakt z żywnością

• Dezynfekcja lodówki

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni wewnętrznych preparatem przeznaczonym do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 2) Wewnętrzne powierzchnie lodówek muszą być dezynfekowane produktem biobójczym przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
- 3) W przypadku powierzchni trudno dostępnych, tj. zawiasów, pokręteł, uchwytów, wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 4) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznych preparatem przeznaczonym do powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 5) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 6) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCYJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	AERODESIN 2000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASACZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Zewnętrzne powierzchnie lodówek po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

• **Dezynfekcja wózków do wydawania posiłków**

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni wewnętrznych preparatem przeznaczonym do powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub używając gotowych chusteczek do dezynfekcji.
- 2) Powierzchnie wózków do wydawania posiłków muszą być dezynfekowane produktem biobójczym przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
- 3) W przypadku powierzchni trudno dostępnych, tj. zawiasów, pokręteł, uchwytów, wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt bezpośrednio z atomizera spieniającego, unikając wytwarzania mgły aerozolowej.
- 4) Wykonać mycie i dezynfekcję kółek preparatem przeznaczonym do powierzchni, nanosząc je za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 5) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 6) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	AERODESIN 2000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Wózki do wydawania posiłków po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

Po procedurze zamgławiania wózek należy przetrzeć jednorazową ściereczką nasączoną wodą zdatną do picia.

• **Dezynfekcja kuchenek mikrofalowych**

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni wewnętrznych kuchenek mikrofalowych preparatem przeznaczonym do powierzchni, nanosząc go za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 2) Wewnętrzne powierzchnie kuchenek mikrofalowych muszą być dezynfekowane produktem biobójczym przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
- 3) W przypadku powierzchni trudno dostępnych, tj. zawiasów, pokręteł, uchwytów wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 4) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznych preparatem przeznaczonym do powierzchni, nanosząc go za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 5) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 6) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	AERODESIN 2000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Zewnętrzne powierzchnie kuchenek mikrofalowych po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub eksponować na światło UV.

• **Dezynfekcja stołów i blatów do przygotowywania i spożywania posiłków**

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni blatów i stołów preparatem przeznaczonym do powierzchni, nanosząc go za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 2) Powierzchnie blatów i stołów do przygotowywania i spożywania posiłków muszą być dezynfekowane produktem biobójczym przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
- 3) W przypadku powierzchni trudno dostępnych wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 4) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 5) Przetrzeć jednorazową ściereczką nasączoną wodą zdatną do picia.
- 6) Odczekać do wyschnięcia.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	AERODESIN 2000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Zewnętrzne powierzchnie stołów i blatów po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

• Dezynfekcja zmywarki

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznej zmywarki preparatem przeznaczonym do powierzchni, nanosząc go za pomocą jednorazowych chusteczek z włókniny lub korzystając z gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji.
- 2) W przypadku powierzchni trudno dostępnych wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt w postaci pianki bezpośrednio z atomizera spieniającego.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.
- 5) Pustą zmywarkę uruchomić w cyklu autoczyszczenia lub uruchomić program z najwyższą temperaturą (tzw. garnki) i dodać standardowy środek do mycia naczyń.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI DOTYKOWYCH	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	AERODESIN 2000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
	MEDIWIPES PLUS	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU SZCZELNIE ZAMKNIJ OPAKOWANIE
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Zewnętrzne powierzchnie zmywarki po myciu i/lub dezynfekcji można poddać procedurze zamgławiania, ozonowania lub ekspozycji na światło UV.

3.15 Postępowanie z dokumentami

• Dokumenty do wydania pacjentowi

- 1) Jeśli to możliwe, należy ograniczyć wydawanie pacjentowi dokumentów w formie papierowej.
- 2) Należy rozważyć kilka możliwości postępowania z dokumentami, które trzeba niezwłocznie wydać pacjentowi:
 - Wykonać skan i wysłać go pacjentowi lub rodzinie drogą mailową.
 - Zalaminować dokument przy użyciu laminarki termicznej – temperatura zgrzewania od 50°C do 120°C (należy wybrać laminarkę o jak najwyższej temperaturze zgrzewania) a przed oddaniem dokumentu pacjentowi zdezynfekować powierzchnię laminatu. Pacjent może wyjąć dokument z laminatu, przecinając zgrzew.
 - Wydać pacjentowi dokumenty w szczelnym woreczku strunowym i zalecić, aby nie otwierał go przed upływem minimum 48 h.

• Dokumenty do archiwizacji

- 1) Jeśli to możliwe, należy ograniczyć liczbę dokumentów archiwizowanych w formie papierowej.
- 2) Zamknąć dokumenty w szczelnym woreczku strunowym i oznaczyć wyraźną etykietą zakazującą otwieranie go przed upływem minimum 48 h (należy podać datę).

UWAGA!

Nie należy podejmować prób dezynfekcji dokumentów. Zamiast dezynfekcji zaleca się poddawanie dokumentów kwarantannie jako najskuteczniejszemu sposobowi ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Kwarantanna 48-godzinna nie wymaga specjalnego sprzętu, nie jest droga i nie grozi uszkodzeniem dokumentów. Płynne środki dezynfekujące mogą powodować uszkodzenia, odbarwienia i plamy. Substancje chemiczne zawarte w produktach mogą reagować z dokumentami i powodować ich nieczytelność.

Nie zaleca się stosowania wobec dokumentów jakichkolwiek metod dezynfekcji drogą powietrzną. Zamgławianie jest nieskuteczne, ponieważ mgła chemiczna nie ma wpływu na zanieczyszczenia między materiałami ułożonymi w stos lub na półkach, wewnątrz pudełka lub między stronami książek i czasopism. Ponadto składniki chemiczne mgły mogą reagować z papierem i z czasem powodować jego uszkodzenie i degradację. Nie zaleca się ekspozycji dokumentów na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Promieniowanie UV jest skuteczne tylko na powierzchniach, które są bezpośrednio narażone na promieniowanie UV, więc materiały ułożone w stos lub strony wewnątrz zamkniętych książek nie zostaną naświetlone. Światło UV może powodować nieodwracalne uszkodzenia dokumentów, w tym blaknięcie czy odbarwienia.

Nie zaleca się umieszczania materiałów papierowych w kuchence mikrofalowej. Książki i inne materiały mogą zawierać metalowe elementy, np. zszywki, które po podgrzaniu mogą się tlić lub zapalać.

3.16 Postępowanie z butami

• Postępowanie z butami personelu

- 1) Należy unikać zanieczyszczania obuwia personelu poprzez nakładanie na obuwie ochraniaczy foliowych sięgających do kolana.
- 2) Należy rozważyć kilka możliwości postępowania z obuwem zanieczyszczonym
 - Należy obuwie zmywalne wymyć i zdezynfekować w urządzeniu automatycznym – program „buty”.
 - Należy zdezynfekować zewnętrzną powierzchnię butów preparatem przeznaczonym do materiałów i tkanin a następnie poddać je procedurze dezynfekcji drogą powietrzną.
 - Należy przetrzeć zewnętrzne powierzchnie butów chusteczką nasączoną środkiem do dezynfekcji lub gotową do użycia chusteczką dezynfekcyjną.

• Postępowanie z butami pacjenta

- 1) Należy unikać zanieczyszczania obuwia pacjenta.
- 2) W miarę możliwości zanieczyszczone obuwie należy oddać za zgodą pacjenta lub rodziny do utylizacji.
- 3) Należy rozważyć kilka możliwości postępowania z obuwem zanieczyszczonym:
 - Należy obuwie zmywalne wymyć i zdezynfekować w urządzeniu automatycznym – program „buty”.
 - Należy zdezynfekować zewnętrzną powierzchnię butów preparatem przeznaczonym do materiałów i tkanin a następnie poddać je procedurze dezynfekcji drogą powietrzną.
 - Należy przetrzeć zewnętrzne powierzchnie butów chusteczką nasączoną środkiem do dezynfekcji lub gotową do użycia chusteczką dezynfekcyjną.
 - Należy obuwie zamknąć w szczelnym worku, opisać i:
 - wydać pacjentowi po 48 h przechowywania
 - wydać pacjentowi w szczelnym worku z informacją po jakim czasie worek można otworzyć.

UWAGA!

Nie podejmuj prób prania wodnego obuwia wykonanego z materiału lub skóry, gdyż grozi to uszkodzeniem obuwia.

Płynne środki dezynfekujące mogą powodować uszkodzenia, odbarwienia i plamy – należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu obuwia przed wykonaniem dezynfekcji.

Obuwie można poddać dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

Światło UV może powodować nieodwracalne uszkodzenia elementów gumowych obuwia.

Można zastosować urządzenia przeznaczone do dezynfekcji obuwia wykorzystujące światło UV.

3.17 Postępowanie z przedmiotami osobistymi pacjenta

- **Odzież przeznaczoną do prania przez szpital**

- 1) Używaną odzież pacjenta przeznaczoną do prania należy zapakować do rozpuszczalnego worka na bieliznę.
- 2) Następnie należy umieścić go w kolejnym, jednoznacznie oznakowanym worku i szczelnie zamknąć.
- 3) Przekazać do prania jak bieliznę skażoną.
- 4) Wszelkie powierzchnie, z którymi miała kontakt brudna bielizna należy poddać dezynfekcji.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	WORKI ROZPUSZCZALNE AQUAFILM	-	WOREK ROZPUSZCZALNY Z BIELIZNĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ W DRUGIM WORKU (FOLIOWYM)

UWAGA!

Jeśli placówka nie podejmuje się prania odzieży pacjenta, należy zapakować ją szczelnie w zwykły worek i wydać pacjentowi lub rodzinie z zaleceniem otwarcia po 48 godzinach od jej zapakowania. Należy dołączyć instrukcję prania zawierającą informacje jak poniżej.

INSTRUKCJA PRANIA ODZIEŻY DLA PACJENTA

1. Wyjmij odzież z foliowego worka.
2. Jeśli odzież zapakowana jest dodatkowo w worek rozpuszczalny, włóż odzież wraz z workiem (bez otwierania) do pralki.
3. Podczas jednego cyklu prania nie łącz odzieży osoby chorej na COVID-19 z pozostałymi rzeczami przeznaczonymi do prania.
4. Ustaw pralkę na program prania w temperaturze minimum 60°C.
5. Jeśli to możliwe, zastosuj proszek do prania o działaniu dezynfekującym.

• Przedmioty osobiste zmywalne

- 1) Wykonać mycie i dezynfekcję powierzchni preparatem przeznaczonym do tego typu powierzchni, nanosząc go za pomocą jednorazowych ściereczek z włókniny lub używając gotowych chusteczek do dezynfekcji.
- 2) W przypadku przedmiotów drobnych i trudno dostępnych, tj. kluczy, pieniędzy, wykonać dezynfekcję, nanosząc produkt z bliska, bezpośrednio z atomizera, unikając wytwarzania mgły aerozolowej lub zanurzyć w preparacie do dezynfekcji.
- 3) Odczekać do osiągnięcia skuteczności wirusobójczej.
- 4) Odczekać do wyschnięcia.
- 5) W przypadku przedmiotów nienadających się do dezynfekcji, rekomenduje się ich utylizację.
- 6) W przypadku braku możliwości utylizacji należy umieścić takie przedmioty w worku, szczelnie zamknąć i oznakować.
- 7) Należy wydać takie przedmioty:
 - pacjentowi lub rodzinie po upływie 48 godzin,
 - w worku oznakowanym datą, przed którą nie należy go otwierać.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA PRZEDMIOTÓW	OXIVIR PLUS SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR EXCEL FOAM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
	OXIVIR SPORICIDE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	UŻYWAJ CZYŚCIWA LUB CHUSTECZEK JEDNORAZOWYCH
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASACZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNIOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

UWAGA!

Stosując środki do dezynfekcji przedmiotów, należy uwzględnić ich wrażliwość na alkohol. Jeśli dezynfekowane są powierzchnie urządzeń elektronicznych, nie należy używać atomizera. Niektóre przedmioty można poddać procedurze dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowania lub ekspozycji na światło UV.

3.18 Postępowanie z przedmiotami pacjenta niemożliwymi do dezynfekcji, tj. torebką, walizką, odzieżą wełnianą, odzieżą skórzaną

1. W miarę możliwości należy zanieczyszczone przedmioty oddać za zgodą pacjenta lub rodziny do utylizacji
2. W przypadku braku możliwości utylizacji należy przedmioty zamknąć w szczelnym worku, opisać i wydać pacjentowi
 - w szczelnym worku po 48 godzinach przechowywania,
 - z informacją, po jakim czasie worek można otworzyć.

UWAGA!

Nie należy podejmować prób dezynfekcji przedmiotów pacjenta, gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Płynne środki dezynfekujące mogą powodować uszkodzenia, odbarwienia i plamy. Niektóre przedmioty można poddać dezynfekcji drogą powietrzną, ozonowaniu lub ekspozycji na światło UV.

4. POZOSTAŁE INSTRUKCJE

4.1 Postępowanie z plamą materiału biologicznego

- W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia biologicznego należy niezwłocznie przystąpić do jego dezaktywacji i usunięcia
- Zestaw do dezaktywacji plam biologicznych powinien znajdować się w ustalonym i jednoznacznie oznakowanym miejscu
- Personel wykonujący czynności przy dezaktywacji plamy biologicznej zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej
 - 1) kombinezon albo długi fartuch ochronny,
 - 2) jednorazową maskę zakrywającą usta i nos,
 - 3) gogle lub przyłbicę ochronną,
 - 4) jednorazowe rękawiczki.

METODA 1

- **Postępowanie z plamą biologiczną: krew, kał, plwocina, wymiociny**
 - 1) Należy ocenić wzrokowo wielkość zanieczyszczenia.
 - 2) Zanieczyszczenie biologiczne należy nakryć odpowiednią ilością chłonnego materiału, np.: jednorazowymi chusteczkami włókninowymi, ręcznikami, czyściwem lub ściereczką chłonną.
 - 3) Zakrytą plamę należy zalać roztworem preparatu chlorowego (10 000 ppm) o czterokrotnie większej objętości niż wielkość zanieczyszczenia.
 - 4) Odczekać czas dezaktywacji deklarowany przez producenta.
 - 5) Zebrać plamę i nasączony materiał chłonny wyrzucić do odpadów niebezpiecznych.
 - 6) Miejsce po plamie zdezynfekować produktem o skuteczności bójczej potwierdzonej w warunkach brudnych i posiadającym deklarację do takiego zastosowania.

METODA 2

- **Postępowanie z plamą biologiczną: krew, kał, plwocina, wymiociny**
 - 1) Należy ocenić wzrokowo wielkość zanieczyszczenia.
 - 2) Zanieczyszczenie biologiczne należy nakryć odpowiednią ilością chusteczek inkrustowanych chlorem.
 - 3) Poczekać, aż materiał biologiczny się wchłonie.
 - 4) Zebrać plamę i nasączone chusteczki inkrustowane chlorem wyrzucić do odpadów niebezpiecznych.
 - 5) Miejsce po plamie zdezynfekować produktem o skuteczności bójczej potwierdzonej w warunkach brudnych i posiadającym deklarację do takiego zastosowania.

METODA 3

- **Postępowanie z plamą biologiczną: krew, kał, plwocina, wymiociny, mocz**
 - 1) Należy ocenić wzrokowo wielkość zanieczyszczenia.
 - 2) Na jednorazową chusteczkę włókninową nanieść gotowy do użycia preparat na bazie nadtlenu wodoru lub użyć gotowej do użycia chusteczki nasączonej nadtlakiem wodoru. Produkty powinny być przeznaczone do dezaktywacji plam biologicznych, w tym plam moczu.
 - 3) Ostrożnie zebrać chusteczką zanieczyszczenie. Jeśli to konieczne, użyć kolejnej chusteczki.
 - 4) Umieścić chusteczki z zanieczyszczeniem w pojemniku na medyczne odpady zakaźne.
 - 5) Zdezynfekować powierzchnię nanosząc obficie preparat na bazie nadtlenu wodoru.
 - 6) Odczekać zalecany przez producenta czas dezaktywacji.

- 7) Przetrzeć powierzchnię jednorazową chusteczką włókninową i umieścić w pojemniku na medyczne odpady zakaźne.

METODA 4

• **Postępowanie z plamą biologiczną: krew, kał, plwocina, wymiociny, mocz**

- 1) Należy zebrać zanieczyszczenie bez dezaktywacji przy pomocy chłonnego materiału, np. jednorazowym ręcznikiem lub ściśiwem a następnie wyrzucić go do odpadów niebezpiecznych.
- 2) Miejsce po plamie zdezynfekować produktem o skuteczności bójczej potwierdzonej w warunkach brudnych i posiadającym deklarację do takiego zastosowania.
- 3) Odczekać czas dezaktywacji zgodnie z rekomendacjami producenta.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZAKTYWACJA PLAM BIOLOGICZNYCH	OXIVIR PLUS SPRAY PREPARAT DO DEZAKTYWACJI PLAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO
	OXIVIR SPORICIDE PREPARAT DO DEZAKTYWACJI PLAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	UŻYWAJ ATOMIZERA SPIENIAJĄCEGO
	OXIVIR SPORICIDE WIPE DO DEZAKTYWACJI PLAM MOCZU	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 5 min	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI METODĄ ZALEWANIA	CHLOR-CLEAN	POSTAĆ: TABLETKI STĘŻENIE: 10 000 ppm DAWKA: 10 TABLETEK NA 1 l WODY CZAS: 15 min	DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ ZALEWANIA I PRZECIERANIA
	TITAN CHLOR PLUS TABLETS		
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI METODĄ ZBIERANIA NA SUCHO	CHLOR-CLEAN WIPES	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: min. 5 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE CHUSTECZKĘ PO UŻYCIU WYRZUĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH CHUSTECZKĘ ZWILŻONĄ WODĄ MOŻESZ UŻYĆ DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO USUNIĘCIU PLAMY
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH

4.2 Postępowanie ze zwłokami

- W przypadku zgonu osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie SARS-CoV-2 niezwłocznie należy poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz dokonać zgłoszenia na odpowiednim druku
- Personel wykonujący czynności przy zmarłym zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej
 - 1) kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę,
 - 2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe – z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2,
 - 3) gogle lub przyłbicę ochronną,
 - 4) jednorazowe rękawiczki nitrylowe.
- Postępowanie ze zwłokami przez personel szpitala w miejscu zgonu
 - 1) Przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.
 - 2) Odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności.
 - 3) Unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok.
 - 4) Umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku.
 - 5) Zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym (preparat alkoholowy).
- Postępowanie ze zwłokami przez pracowników zakładu pogrzebowego
 - 1) Zwłoki zabezpieczone w sposób, o którym mowa w pkt. 1, 4 i 5, umieścić w:
 - kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekontaminacji środkami powierzchniowo czynnymi albo
 - trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.
 - 2) Umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm.
 - 3) Niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.

UWAGA:

Pomieszczenie, w którym przebywała osoba zmarła, oraz wszystkie przedmioty, z którymi miała styczność, poddaje się dezynfekcji produktami na bazie chloru.

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ


(NALEŻY ZASTOSOWAĆ **JEDEN** Z ZAPROPONOWANYCH PREPARATÓW DLA KAŻDEGO OBSZARU):

OBSZAR	PRODUKT	STĘŻENIE/CZAS	UWAGI
DEZYNFEKCJA SKÓRY	AHD 1000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ PREPARATU, ZWILŻAJĄC JEDNORAZOWE CZYŚCIWO LUB CHUSTECZKI
	HOSPISEPT-TUCH	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	FUGATEN SPRAY	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH WORKA NA ZWŁOKI
	MEDIQUICK	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH WORKA NA ZWŁOKI
	SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	UŻYWAJ ATOMIZERA TYLKO NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH WORKA NA ZWŁOKI
AKCESORIA	MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH JEŚLI KORZYSTASZ Z CZYŚCIWA NASĄCZONEGO W WIADERKU, PO UŻYCIU SZCZELNIE JE ZAMKNIJ
	JEDNORAZOWE CHUSTECZKI WŁÓKNINOWE	-	PO UŻYCIU CHUSTECZKĘ NALEŻY WYRZUCIĆ DO ODPADÓW SKAŻONYCH
DEZYNFEKCJA RĄK	AHD 1000	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
	PHAGO'GEL	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	WCIERAJ PREPARAT ZGODNIE Z PROCEDURĄ WG AYLIFFE
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	CHLOR-CLEAN TITAN CHLOR PLUS TABLETS	POSTAĆ: TABLETKI STĘŻENIE: 10000 ppm DAWKĄ: 10 TABLETEK NA 1 l WODY CZAS: 15 min	DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE METODĄ PRZECIERANIA
GOGLE PRZYŁBICE	MEDIWIPES DM	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 1 min	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
	OXIVIR EXCEL WIPE	POSTAĆ: GOTOWY DO UŻYCIA CZAS: 30 s	PO UŻYCIU ZAMKNIJ SZCZELNIE OPAKOWANIE
	ENZYMEX L9	POSTAĆ: KONCENTRAT CZAS: 10 min	PRZYGOTUJ ROZTWÓR ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO O ODPOWIEDNIM STĘŻENIU UŻYWAJ WANNY DEZYNFEKCYJNEJ Z SITEM I POKRYWĄ
	WANNA DEZYNFEKCYJNA	POJEMNOŚĆ: MINIMUM 10 l	PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM OZNAKOWANIU WANNY

5. LITERATURA

- COVID-19 PCN Incident Response Task Force Environmental Cleaning Guidelines during COVID-19 for Community Physicians and Teams, Last Update: 10/02/2020 1600h, ECC Approved: 05/0520 0912h, Distribution: COVID-19 PCN Incident Response Task Force, ahs.ca/covidPHC, Environmental Cleaning Guidelines during COVID-19 for Community Physicians and Teams
- [https://www.health.qld.gov.au/public-health/industry-environment/disease-prevention-control/covid19-industry/covid-19-cleaning-disinfection-waste-management\](https://www.health.qld.gov.au/public-health/industry-environment/disease-prevention-control/covid19-industry/covid-19-cleaning-disinfection-waste-management/)
- Queensland Health website www.health.qld.gov.au/coronavirus for latest updates on COVID-19
- Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in Healthcare (2010)
- Australian/New Zealand Standard (AS/NZS) 4146:2000 Laundry practice
- Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19, WHO Interim guidance, 15 May 2020
- ECDC TECHNICAL REPORT, Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare, settings potentially contaminated with SARS-CoV-2, March 2020,
- Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Healthcare Facility Cleaning and Disinfection Guide, May 12, 2020
- World Health Organization (WHO). „Q&A: How is COVID-19 transmitted?” July 9, 2020. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). „How to Protect Yourself & Others” <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). „What Mail and Parcel Delivery Drivers Need to Know about COVID-19” <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/mail-parcel-drivers.html>
- Neeltje van Doremalen, Dylan H. Morris, Myndi G. Holbrook, et. Al. „Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1” (Correspondence). The New England Journal of Medicine. March 17, 2020. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973>
- Alex W H Chin, Julie T s Chu, Mahen R A Perera, Kenrie P Y Hui, Hui-Ling Yen, Michael C W Chan, Malik Peiris, Leo M Poon. „Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions” medRxiv. May 2020. 10.1016/S2666-5247(20)30003-3
- Yongjian Liu, Tianyi Li, Yongqiang Deng, Siyang Liu, Dong Zhang, Hanping Li, Xiaolin Wang, Lei Jia, Jingwan Han, Zhuchun Bei, Yusen Zhou, Lin Li, Jingyun. „Stability of SARS-CoV-2 on environmental surfaces and in human excreta” medRxiv. May 12, 2020. <https://doi.org/10.1101/2020.05.07.20094805>
- Reopening Archives, Libraries, and Museums (REALM) Project. „REALM Project Test 4 Results Available” <https://www.webjunction.org/news/webjunction/test4-results.html>
- Reopening Archives, Libraries, and Museums (REALM) Project. „Resources” Includes all test results. <https://www.webjunction.org/explore-topics/COVID-19-research-project/resources.html>
- Reopening Archives, Libraries, and Museums (REALM) Project. „Public Libraries Preparing to Reopen: Examples from the Field” June 25, 2020. <https://www.webjunction.org/news/webjunction/preparing-to-reopen.html>
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). „COVID-19 and the Global Library Field: Staying safe at home and work: Handling materials” <https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#handling>
- Canadian Conservation Institute. „Agent of Deterioration: Pollutants, Airborne” <https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/agents-deterioration/pollutants.html#pollu2>
- U.s. Food and Drug Administration (FDA). „UV Lights and Lamps: Ultraviolet-C Radiation, Disinfection, and Coronavirus” <https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus>
- American Institute for Conservation. „AIC Wiki: Light” http://www.conservation-wiki.com/wiki/Light#Light_Damage
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). „Cleaning and Disinfection for Community Facilities” <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html>
- United States Environmental Protection Agency. „6 Steps for Safe & Effective Disinfectant Use” (infographic). PDF version at <https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf>

- United States Environmental Protection Agency. „List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2.” <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19>.
- Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)
- Günter Kampf, Daniel Todt, Stephanie Pfaender, Eike Steinmann, Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents, February 2020, Journal of Hospital Infection 104(3), DOI: 10.1016/j.jhin.2020.01.022
- Izabela Betlej, Działanie wirusobójcze produktów biobójczych w różnych obszarach zastosowania, 21.04.2017, THETA Doradztwo Techniczne
- Krzysztof Pyrc, Ludzkie koronawirusy, „Postępy Nauk Medycznych”, XXVIII (4B), Borgis, 2015, s. 48-54
- SARS-CoV-2 Transmission, <https://www.worldometers.info/coronavirus/transmission/>, 16.04.2020
- Cleaning and Disinfection for Households, Interim Recommendations for U.s. Households with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), CDC recommendation, 20.03.2020
- Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus, WHO, Interim guidance, 19.03.2020
- Zapobieganie i leczenie COVID-19, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine (FAHZU), Publikacja zgodna z doświadczeniem klinicznym, 1.03.2020
- Anna Szczypta, Edyta Synowiec, Katarzyna Salik, Wytyczne zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym, 17.04.2020




MEDILAB[®]
3D
PROGRAM

DORADZI

DOBIERZE

DOSTARCZY