



# PLAN HIGIENY ŻŁOBKI | PRZEDSZKOLA

## REŃCE I SKÓRA

CO?	KIEDY?	JAK?	CZYM?
Mycie rąk personelu placówki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przed rozpoczęciem pracy</li> <li>Po wyjściu z toalety</li> <li>Przy widocznym zabrudzeniu</li> <li>Przed podawaniem posiłków</li> <li>Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami</li> <li>Przed dezynfekcją higieniczną, jeśli ręce są zabrudzone</li> <li>Zawsze w razie potrzeby</li> </ul>	Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika porcję płynu myjącego, rozprowadzić zgodnie ze schematem wg Ayliffe'a, następnie dokładnie spłukać i osuszyć dłonie.	<b>Sterisol Äkta Liquid Soap</b> <b>MediSoap Neutral</b> <b>Dozownik łokciowy Sterisol</b> <b>Dozownik uniwersalny łokciowy</b>
Dezynfekcja rąk personelu placówki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przed rozpoczęciem pracy</li> <li>Po zakończeniu pracy</li> <li>Przed podawaniem posiłków</li> <li>Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami</li> <li>Zawsze w razie potrzeby</li> </ul> <b>UWAGA!</b> Ręce przed dezynfekcją muszą być czyste i suche.	Na suchą skórę rąk nanieść preparat dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać w skórę rąk zgodnie ze schematem wg Ayliffe'a, a następnie aż do wyschnięcia przez minimum 30 s.	<b>Sterisol AHD 1000</b> <b>Sterisol Phago'Gel</b> <b>Phago'Gel</b> <b>Dozownik łokciowy Sterisol</b>

## POWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE

CO?	KIEDY?	JAK?	CZYM?
<b>POWIERZCHNIE MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE:</b> Odporne na działanie alkoholu, np.: stoliki, krzesła i wszelkie inne przedmioty ulegające zanieczyszczeniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zawsze w razie potrzeby</li> <li>Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci</li> <li>W czasie nasilonego występowania biegunk i przeziębień zaleca się zwiększenie częstotliwości dezynfekcji</li> </ul>	Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki. Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. <b>UWAGA!</b> Preparaty stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie. <b>UWAGA!</b> Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi! Powierzchnie pozostające w kontakcie z nieopakowaną żywnością należy po dezynfekcji dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.	<b>MediQuick</b> alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 30 s lub <b>Aerodesin 2000</b> alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min lub <b>Mediwipes Plus</b> chusteczki gotowe do użycia - min. 1 min lub <b>Fugaten-Spray</b> alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min
Wrażliwe na działanie alkoholu, np.: przewijaki, tapicerki, materace do ćwiczeń, foteliki, łóżeczka, termometry i inne małe powierzchnie ulegające zanieczyszczeniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni</li> <li>Zawsze w razie potrzeby</li> <li>Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci</li> <li>W czasie nasilonego występowania biegunk i przeziębień zaleca się zwiększenie częstotliwości dezynfekcji</li> </ul>	Nanieść preparat bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię z odległości 30 cm lub na suchą, czystą ściereczkę. Dokładnie rozprowadzić za pomocą ściereczki po całej powierzchni. Nie wycierać do sucha, nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. Przetrzeć powierzchnię chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. Powierzchnie pozostające w kontakcie z nieopakowaną żywnością należy po dezynfekcji dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.	<b>Oxivir Plus Spray</b> spray gotowy do użycia - min. 5 min <b>Lysoformin Plus-Schaum</b> pianka gotowa do użycia - min. 5 min lub <b>Mediwipes DM</b> chusteczki gotowe do użycia - min. 5 min

ZABAWKI	POMIESZCZENIA	SANITARIATY
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zawsze w razie potrzeby</li> <li>Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci</li> <li>W czasie nasilonego występowania biegunk i przeziębień zaleca się zwiększenie częstotliwości dezynfekcji</li> </ul>	Sale gimnastyczne, pokoje zabaw, szatnie, a w nich: podłogi, blaty, drzwi, glazury, parapety i inne duże zmywalne powierzchnie  Łazienki, a w nich: umywalki, wanny, brodziki prysznicowe, muszle klozetowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni</li> <li>Zawsze w razie potrzeby</li> <li>Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci</li> </ul>
Zabawki spryskać i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zalecanym czasem ekspozycji, po czym dokładnie zmyć wodą zdatną do picia.  Nie stosować do zabawek pluszowych i tekstylnych.	Za pomocą mopów i ściereczek myć i dezynfekować, przecierając dokładnie całą powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.  Nie stosować na wykładziny materiałowe.  Tabletki rozpuścić w wodzie. Powierzchnie zmyć roztworem myjąco-dezynfekującym. Odczekać wymagany czas ekspozycji.  Chusteczki inkrustowane chlorem zwilżyć wodą, odcisnąć nadmiar wody. Powierzchnie zmyć roztworem myjąco-dezynfekującym. Odczekać wymagany czas ekspozycji.	Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki.  Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. <b>UWAGA!</b> Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi!
<b>Fugaten-Spray</b> alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min lub <b>MediQuick</b> alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 30 s lub <b>Lysoformin Plus-Schaum</b> pianka gotowa do użycia - min. 5 min	<b>TASKI Sprint Degerm</b> koncentrat do mycia i dezynfekcji 0,5% - min. 5 min 5 ml koncentratu/1 l wody  <b>Chlor-Clean</b> tabletki - 2 tabl./1l wody, 10 tabl./5l - min. 5 min lub <b>Chlor-Clean Wipes</b> inkrustowane chlorem suche chusteczki - min. 5 min	<b>Fugaten-Spray</b> alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 1 min lub <b>MediQuick</b> alkoholowy spray gotowy do użycia - min. 30 s

