



**Kompleksowy
program higieny**

Bezpieczny gabinet beauty

1 Sterisol Äkta Liquid Soap
Sterisol AHD 1000
Sterisol Phago'Gel
MediSoap Neutral
Phago'Gel
Mediwax


2 Enzymex L9

3 TASKI Sprint Degerm

4 Oxivir Plus Spray
Lysoformin Plus-Schaum
Mediwipes DM

5 MediQuick
Aerodesin 2000
Oxivir Plus Spray
Mediwipes Plus

6 Mediroll
Medibag
Testy do kontroli sterylizacji



STERISOL ÄKTA LIQUID SOAP

Mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Przebadane dermatologicznie oraz zgodnie z normą EN 1499. Dedykowane do dozownika Sterisol.

STERISOL AHD 1000

Płyn na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Dedykowany do dozownika Sterisol.

STERISOL PHAGO'GEL

Żel na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Dedykowany do dozownika Sterisol.

MEDISOAP NEUTRAL

Mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Zawiera substancje pielęgnujące naturalną warstwę skóry.

PHAGO'GEL

Żel na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro).

MEDIWAX

Wysokiej jakości krem do pielęgnacji skóry rąk. Zawiera kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i witaminy.

ENZYMEX L9

Tróenzymatyczny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc (M. terrae), Y (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes). Stężenie: min. 0,5%. Czas działania: 10 min.

TASKI SPRINT DEGERM

Koncentrat do dezynfekcji i mycia podłóg oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Noro, Rota). Stężenie: min. 0,5%. Czas działania: min. 5 min.

OXIVIR PLUS SPRAY

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V. Czas działania: min. 5 min. Produkt do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych (krew, wydzieliny, wydaliny, w tym płyny moczowe). Posiada certyfikat WoolSafe.

LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM

Gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa - SV 40). Czas działania: min. 5 min. Nieograniczona kompatybilność materiałowa.

MEDIWIPES DM

Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV, Rota, Polyoma). Czas działania: min. 5 min.

MEDIQUICK

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro). Czas działania: min. 30 s.

AERODESIN 2000

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, Y, V (Polio, Adeno, Noro). Czas działania: min. 1 min.

MEDIWIPES PLUS

Chusteczki nasączone alkoholem do dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V. Czas działania: min. 1 min.

MEDIROLL I MEDIBAG

Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.

Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.

TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI

Test kontroli skuteczności procesu sterylizacji gorącą parą wodną, tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem w autoklawach.

Bezpieczny gabinet beauty



Procedury higieniczne.

Przed każdym klientem

- Należy zdezynfekować ręce.
- Należy założyć czysty fartuch i rękawiczki.
- Należy przygotować sterylne narzędzia.

Po każdym kliencie

- Należy zdezynfekować ręce.
- Należy używane narzędzia umieścić w wannie dezynfekcyjnej z roztworem środka dezynfekcyjnego.
- Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe łóżka zabiegowego, lampę, klamki, uchwyty, blaty mebli.

Po każdym dniu roboczym i zawsze w razie potrzeby

- Należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe tj. blaty, stoliki, miejsca siedzące.
- Należy zdezynfekować klamki, włączniki światła itp.
- Należy umyć i/lub zdezynfekować podłogę.

Okresowo i zawsze w razie potrzeby

- Należy przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń gabinetu używając urządzeń do dezynfekcji drogą powietrzną.

Procedury dezynfekcji przedmiotów i/lub powierzchni dotykowych należy prowadzić poprzez przecieranie: jednorazowymi gotowymi chusteczkami dezynfekującymi, pianką lub jednorazowym czyściwem nasączonym preparatem dezynfekującym i/lub myjąco-dezynfekującym.

Zaleca się wybór środków dezynfekcyjnych o skuteczności bójczej udokumentowanej badaniami normatywnymi dla obszaru medycznego.

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 53 • F: 085 747 93 28
handlowy@medilab.pl



medilab.pl